

CORRESPONDANCE DE JACQUET-LANGLANDS ÉTENDUE À TOUTES LES REPRÉSENTATIONS

par Alexandru Ioan BADULESCU¹

Abstract : We give here a generalization of the local Jacquet-Langlands correspondence to all the smooth irreducible representations. This correspondence is characterized by the fact that it respects the classical Jacquet-Langlands correspondence and it commutes with the parabolic induction functor. It has good behaviour with respect to the Jacquet functor and the Aubert involution. Using this correspondence, we prove some particular cases of the global Jacquet-Langlands correspondence and we deduce that a class of representations of an inner form of GL_n over a p -adic field is unitarizable.

Mathematics Subject Classification (2000): 20G05-20G25-20G30

CONTENTS

1. Introduction	2
2. Irréductibilité des induites des représentations de carré intégrable	5
3. (Une) correspondance de Jacquet-Langlands généralisée	13
3.1. Correspondance entre les groupes de Grothendieck	13
3.2. Correspondance entre les algèbres de Hopf	17
3.3. Une précision	23
3.4. Une conjecture	27
3.5. L'involution	29
4. Quelques résultats globaux et leur conséquences locales	30
4.1. Un lemme	30
4.2. Sur la correspondance de Jacquet-Langlands globale	31
4.3. Conséquences sur l'unitarisabilité	36
5. Bibliographie	37

¹Alexandru Ioan BADULESCU, Université de Poitiers, UFR Sciences SP2MI,
Département de Mathématiques, Téléport 2, Boulevard Marie et Pierre Curie, BP 30179,
86962 FUTUROSOCPE CHASSENEUIL CEDEX
E-mail : badulescu@wallis.sp2mi.univ-poitiers.fr

1. INTRODUCTION

Le but principal de cet article est d'étudier plus à fond la correspondance de Jacquet-Langlands, plus précisément chercher une correspondance pour une classe plus large de représentations que la classe des représentations de carré intégrable. Non seulement la question est naturelle, mais aussi elle intervient de façon inéluctable quand on essaye de démontrer une correspondance de Jacquet-Langlands globale, entre les représentations automorphes de GL_n et les représentations automorphes de ses formes intérieures sur un corps global. Naïvement, on attendrait d'une telle correspondance qu'elle respecte localement, à chaque place, la correspondance de Jacquet-Langlands locale. Ceci n'est en fait jamais vrai. Prenons le cas le plus simple traité dans [Vi]. Soit F un corps local non archimédien et D une algèbre à division centrale et de dimension n^2 sur F . La correspondance de Jacquet-Langlands locale réalise une bijection entre l'ensemble des classes d'équivalence des représentations de carré intégrable de $GL_n(F)$ et l'ensemble des classes d'équivalence des représentations lisses irréductibles unitaires de D^* . Mais, une correspondance globale du type de celle établie dans [Vi], mettra en correspondance localement une représentation lisse irréductible unitaire de D^* soit avec la représentation de carré intégrable π de $GL_n(F)$ qui lui correspond par Jacquet-Langlands, soit avec la duale de π au sens de [Ze]. Elle ne respecte donc pas toujours localement la correspondance de Jacquet-Langlands. Le cas général est encore plus compliqué, une correspondance globale complète faisant intervenir automatiquement et le spectre cuspidal et le spectre résiduel des deux groupes. Or, la correspondance de Jacquet-Langlands locale classique ne traite tout au plus que des représentations tempérées, tandis que les composantes locales des représentations automorphes irréductibles dans le spectre résiduel de GL_n ne sont pas tempérées, et souvent elles ne sont pas non plus duales des représentations de carré intégrable ([MW]). Donc, tôt ou tard se poseront les questions, si $G = GL_n(F)$, F corps local non archimédien, et G' est une forme intérieure de G ,

- 1) en se donnant une représentation lisse irréductible (eventuellement unitaire) de G qui n'est pas tempérée, y a-t-il une représentation de G' qui lui correspond ou non ? et
- 2) si oui, la représentation qui lui correspond est-elle irréductible ou non ?

Notre article donne une réponse assez satisfaisante à la première question, mais pour la deuxième question la réponse n'est pas satisfaisante, sauf dans le cas des représentations duales (au sens de [Ze] ou [Au]) des représentations tempérées. Le lecteur remarquera que cette classe de représentations est assez importante pour la correspondance globale, vu la classification du spectre résiduel de GL_n ([MW]).

Soit F un corps local non archimédien. Posons $G = GL_n(F)$ et soit G' une forme intérieure de G . Si $g \in G$ et $g' \in G'$ on dit que g et g' *se correspondent* si g et g' sont semisimples réguliers et ont le même polynôme caractéristique. Alors tout élément conjugué à g et tout élément conjugué à g' se correspondent. Notons $G_{G'}$ l'ensemble des éléments de G qui correspondent à un élément de G' . Soient f une fonction invariante par conjugaison définie sur $G_{G'}$ et f' une fonction invariante par conjugaison définie sur l'ensemble des éléments semisimples réguliers de G' . On dit que f et f' *se correspondent* si elles sont égales sur des classes de conjugaison qui se correspondent. Par abus, si f est

définie sur un sous-ensemble de G contenant $G_{G'}$, nous dirons qu'elle correspond à f' si la restriction de f à $G_{G'}$ correspond à f' . Typiquement, ici, les fonctions invariantes par conjugaison seront des combinaisons linéaires de caractères de représentations.

Alors la réponse à la première question posée plus haut est la suivante : si π est une représentation lisse irréductible de G , alors ou bien le caractère de π est nul sur $G_{G'}$ ou bien sa restriction à $G_{G'}$ correspond à une combinaison linéaire de caractères de représentations lisses irréductibles de G' (le premier cas est en fait cas particulier du deuxième, en considérant la combinaison nulle). Les coefficients de la combinaison sont entiers. Ceci se traduit par un morphisme de groupes entre les groupes de Grothendieck $Grot(G)$ et $Grot(G')$ des représentations lisses de longueur finie de G et G' :

Théorème. *Il existe un unique morphisme de groupes*

$$\mathbf{LJ} : Grot(G) \rightarrow Grot(G')$$

tel que, pour tout $\pi \in Grot(G)$, le caractère de π correspond au caractère de $\mathbf{LJ}(\pi)$. Ce morphisme est surjectif et il prolonge la correspondance de Jacquet-Langlands au signe près.

Nous pouvons également décrire le noyau de $\mathbf{LJ}$. Ce qui est important aussi est de définir une section, un morphisme en sens inverse. Ici il faut faire un choix. Nous pouvons définir un morphisme injectif de groupes

$$\mathbf{JL} : Grot(G') \rightarrow Grot(G),$$

prolongeant la correspondance de Jacquet-Langlands au signe près et tel que, pour tout $\pi \in Grot(G')$, le caractère de π correspond au caractère de $\mathbf{JL}(\pi)$. Pour des énoncés plus précis, voir le th. 3.2 et la prop. 3.3, section 3.1. Le choix que nous avons fait pour définir $\mathbf{JL}$ semble très naturel, comme nous l'expliquons plus bas, seulement $\mathbf{JL}$ ne transforme pas une représentation irréductible en une représentation irréductible. Le problème qui se pose, et auquel l'auteur de cet article n'a pas de réponse, est : existe-t-il une autre section de $\mathbf{LJ}$ qui transforme une représentation irréductible en une représentation irréductible ? Remarquons que les morphismes $\mathbf{LJ}$ et $\mathbf{JL}$ tels que nous les avons définis, ensemble avec l'étude de leur comportement vis-à-vis des foncteurs d'induction et de restriction parabolique que nous faisons par la suite, semblent être importants pour résoudre la question plus difficile de l'irréductibilité. Par exemple, même si $\mathbf{LJ}$ ne respecte pas la dualité sur les deux groupes, il permet néanmoins de montrer que, si deux représentations se correspondent par $\mathbf{LJ}$, les caractères de leurs duales se correspondent au sens défini plus haut et au signe près (voir la section 3.5). Ce résultat, appliqué aux représentations duales des représentations de carré intégrable, joue un certain rôle dans la compréhension de la correspondance globale.

À partir des groupes de Grothendieck des représentations lisses de longueur finie associés aux groupes linéaires sur F , Zelevinski a construit une algèbre de Hopf avec involution ([Ze]). Le même type de construction peut être faite pour les groupes linéaires sur une algèbre à division D de dimension finie et centrale sur F , les groupes étant cette fois des formes intérieures du groupe linéaire sur F ([Ta]). Dans la sous-section 3.2, nous montrons que les morphismes définis entre les groupes de Grothendieck donnent lieu à

des morphismes entre les algèbres de Hopf (la situation est un peu plus compliquée, voir le th. 3.6). Ce morphisme entre les algèbres de Hopf traduit le comportement de la correspondance **JL** que nous avons définie vis-à-vis de l'induction parabolique et du foncteur de Jacquet de restriction. C'est l'unique correspondance qui respecte les caractères, la correspondance de Jacquet-Langlands classique, et commute avec l'induction parabolique. Elle ne commute pas à proprement parler avec le foncteur de Jacquet, mais les restrictions de deux représentations qui se correspondent par **JL** ont des caractères qui se correspondent.

Comme nous l'avons signalé, notre correspondance n'envoie pas (même au signe près) les représentations irréductibles sur des représentations irréductibles, et cela même dans le cas le plus simple où $G' = GL_2(D)$, D algèbre à division, centrale et de dimension finie sur F (voir le commentaire 2 au th. 3.2). Ceci constitue un problème pour l'établissement d'une correspondance de Jacquet-Langlands globale complète et il faudra mieux comprendre le phénomène. D'autre part, la correspondance **JL** n'est pas uniquement déterminée par la relation entre les caractères. On peut donc se poser la question si, en renonçant à l'hypothèse que la correspondance commute avec le foncteur d'induction, on peut construire une autre correspondance qui envoie des représentations irréductibles sur des représentations irréductibles. Nous conjecturons l'existence d'une correspondance qui vérifie la relation des caractères et qui est définie par le fait qu'elle respecte les paramètres de Langlands (sect. 3.4). Nous ne connaissons pas la réponse à cette question mais nous la vérifions dans le cas le plus simple $G' = GL_2(D)$.

Toutes ces constructions sont basées sur le fait que, si G' est une forme intérieure de $GL_n(F)$, F corps local non archimédien, alors l'induite à G' d'une représentation de carré intégrable d'un sous-groupe de Levi d'un sous-groupe parabolique de G' est irréductible. Ce résultat a été prouvé par Deligne, Kazhdan et Vignéras dans le cas où la caractéristique de F est nulle. Suivant leur méthode et utilisant la théorie des corps proches à la Kazhdan que nous avons développée dans [Ba2], nous prouvons ce résultat en caractéristique non nulle (sect. 2). Ainsi, tous les résultats sont valables en toute caractéristique.

Dans la section 4 nous montrons quelques cas particuliers de correspondance de Jacquet-Langlands globale. Ici nous voyons l'importance de la compréhension de la correspondance locale pour d'autres représentations que les représentations de carré intégrable. Comme illustration du principe local-global-local, nous obtenons comme corollaire de la correspondance globale le fait que les représentations duales des représentations de carré intégrable de G' sont unitaires, ainsi que d'autres cas d'unitarisabilité, tous prévus par les conjectures de [Ta].

Une partie importante de ce travail provient d'une thèse écrite sous la direction de Guy Henniart et je voudrais le remercier ici pour son aide inestimable. Je remercie également Colette Moeglin, Hervé Jacquet, Bertrand Lemaire et Anne-Marie Aubert qui ont lu partiellement le manuscrit et lui ont apporté des corrections et suggestions. Merci à Andrei Moroianu pour le contre-exemple de la section 3.3.

2. IRRÉDUCTIBILITÉ DES INDUITES DES REPRESENTATIONS DE CARRÉ INTÉGRABLE

Soient F un corps local non archimédien de caractéristique quelconque, D une algèbre à division centrale sur F , de dimension finie d^2 , r un entier strictement positif et $G' = GL_r(D)$. Le but de cette section est de montrer le théorème 2.1 plus bas. Le cas de caractéristique nulle a été prouvé dans [DKV] (théorème B.2.d) et c'est là qu'apparaît l'idée d'utiliser le théorème de Paley-Wiener. On prouve ici le cas de caractéristique non nulle, en utilisant la méthode des corps proches.

Théorème 2.1. *Soit P un sous-groupe parabolique de G' et soit $P = LU$ une décomposition de Levi de P . Soit π une représentation de carré intégrable de L . Alors $\text{ind}_P^{G'} \pi$ est irréductible.*

On note $\Psi(G')$ l'ensemble des caractères lisses non ramifiés de G' . L'ensemble $\Psi(G')$ admet une structure naturelle de variété algébrique. Si π est une représentation admissible de G' , on note $\Psi(G'; \pi)$ l'ensemble de classes de représentations du type $\psi \otimes \pi$, $\psi \in \Psi(G')$ ($\Psi(G'; \pi)$ a une structure de variété algébrique isomorphe à un quotient de la variété $\Psi(G')$). On note $Grot(G')$ le groupe de Grothendieck des représentations lisses de longueur finie de G' . À part l'ensemble des classes de représentations lisses irréductibles, $Grot(G')$ admet une autre $\mathbb{Z}$ -base remarquable, voir paragraphes suivants.

Appelons un sous-groupe parabolique de G' *standard* s'il contient le groupe des matrices triangulaires supérieures, et un sous-groupe de Levi de G' *standard* s'il est un sous-groupe de Levi d'un sous-groupe parabolique standard. Si L est un sous-groupe de Levi standard de G' alors il existe une partition $A_1 \coprod A_2 \coprod \dots \coprod A_k$ de l'ensemble $\{1, 2 \dots r\}$ où $A_1 = \{1, 2 \dots r_1\}$, $A_2 = \{r_1 + 1, r_1 + 2 \dots r_1 + r_2\}$ etc. telle que L soit l'ensemble des matrices $M = (m_{ij})_{1 \leq i, j \leq r} \in G'$ telles que m_{ij} est nul si $(i; j) \notin \cup_{u=1}^k A_u \times A_u$. Nous identifions alors L au produit $GL_{r_1}(D) \times GL_{r_2}(D) \times \dots \times GL_{r_k}(D)$. Les notations du paragraphe précédent s'appliquent aussi à tout sous-groupe de Levi standard de G' .

Si $\nu \in \Psi(L)$, alors $\nu = \prod_{u=1}^k \nu_u$, où $\nu_u \in \Psi(GL_{r_u}(D))$ et s'écrit donc $\nu_u = |\det|^{c_u}$, où c_u est un nombre complexe. On dit que ν est strictement positif si $u \mapsto \text{Re}(c_u)$ est une fonction strictement croissante.

Nous appelons *représentation de Langlands* une représentation du type $\text{ind}_Q^{G'} \nu \otimes \tau$ où Q est un sous-groupe parabolique standard de G' , τ est une représentation tempérée du sous-groupe de Levi de Q , et ν est un caractère strictement positif. L'ensemble des représentations de Langlands forme une base de $Grot(G')$ ([DKV], A.4.f) que nous appellerons *la base de Langlands*. Nous appellerons *représentation de Langlands strictement induite* une représentation comme plus haut avec $Q \neq G'$. On note $W(G')$ le groupe formé par les matrices de permutation dans G' qu'on identifie aussi avec le groupe des permutations de l'ensemble $\{1, 2 \dots r\}$. Si L est un sous-groupe de Levi standard de G' et $g \in G'$, alors on pose ${}^g L = gLg^{-1}$ (même notation aussi pour les paraboliques) et si π est une représentation de L , on note ${}^g \pi$ la représentation de ${}^g L$ définie par ${}^g \pi(x) = \pi(g^{-1}xg)$. On utilise aussi les notations : L^g pour ${}^{g^{-1}} L$ et π^g pour ${}^{g^{-1}} \pi$.

Une représentation de G' est dite *essentiellement de carré intégrable* si elle peut s'écrire comme produit tensoriel d'une représentation de carré intégrable et d'un caractère de G' . Nous abrégeons ici représentation(s) essentiellement de carré intégrable par *r.e.c.i.*. Nous en rencontrerons beaucoup par la suite. Une représentation est dite *essentiellement tempérée* si elle peut s'écrire comme produit tensoriel d'une représentation tempérée et d'un caractère de G' .

Démonstration. On peut supposer que P est standard. Nous montrons le théorème par récurrence sur l'entier strictement positif k tel que $G' = GL_k(D)$ (D est fixée). Pour $k = 1$ le théorème est évident. Supposons que le théorème est vérifié pour tout $k < r$. Supposons maintenant par l'absurde qu'il existe un sous-groupe parabolique propre P_0 de $G' = GL_r(D)$, une décomposition de Levi $P_0 = L_0 U_0$ de P_0 et une représentation de carré intégrable π_0 de L_0 telle que l'induite de P_0 à G' de la représentation π_0 ne soit pas irréductible. On sait qu'on a dans $Grot(G')$:

$$ind_{P_0}^{G'} \pi_0 = \sum_{i=1}^s a_i \tau_i$$

où les a_i sont des entiers strictement positifs et les τ_i sont des représentations tempérées de G' non équivalentes, et aucune parmi les τ_i n'est de carré intégrable.

Lemme 2.2. *On a $s = 1$.*

Démonstration. Supposons par l'absurde que $s \geq 2$. On a alors deux cas :

Premier cas : Il existe un $i \in \{2, 3, \dots, s\}$ tel que $\tau_i \notin \Psi(G'; \tau_1)$. On peut supposer que $i = 2$. Posons

$$\{\tau_1, \tau_2, \tau_3, \dots, \tau_s\} \cap \Psi(G'; \tau_1) = \{\tau_{i_1} = \tau_1, \tau_{i_2}, \tau_{i_3}, \dots, \tau_{i_p}\}$$

et

$$\{\tau_1, \tau_2, \tau_3, \dots, \tau_s\} \cap \Psi(G'; \tau_2) = \{\tau_{j_1} = \tau_2, \tau_{j_2}, \tau_{j_3}, \dots, \tau_{j_q}\}.$$

Soient

$$\alpha = \sum_{u=1}^q a_{j_u}$$

et

$$\beta = \sum_{v=1}^p a_{i_v}.$$

On considère alors la forme linéaire f sur $Grot(G')$ définie sur la base de Langlands par :

- 1) $f(\rho) = \alpha$ si $\rho \in \Psi(G'; \tau_1)$
- 2) $f(\rho) = -\beta$ si $\rho \in \Psi(G'; \tau_2)$
- 3) $f(\rho) = 0$ si ρ est une représentation de la base de Langlands de $Grot(G')$ qui n'est pas dans l'un des deux cas précédents.

Remarque. Les conditions 1) et 2) ont été choisies de façon à ce que 1), 2) et 3) impliquent que $f(\chi \otimes ind_{P_0}^{G'} \pi_0) = 0$ pour tout $\chi \in \Psi(G')$. On a aussi $f(\tau_1) = \alpha \neq 0$.

Deuxième cas : Pour tout $i \in \{2, 3, \dots, s\}$ il existe un caractère $\chi_i \in \Psi(G')$ tel qu'on ait $\tau_i = \chi_i \otimes \tau_1$. Alors, par l'unicité modulo conjugaison de l'induite d'une représentation de carré intégrable qui contient une représentation tempérée donnée, on en déduit que les χ_i vérifient :

$$(res_{P_0}^{G'} \chi_i) \otimes \pi_0 \simeq \pi_0^w$$

où w est un élément du groupe de Weyl du tore maximal standard de L_0 dans G' . Soit K l'ensemble de tous les caractères $\chi \in \Psi(G')$ qui vérifient une telle relation. K est un sous-groupe de $\Psi(G')$. Si χ_1 est le caractère trivial de G' , $\{\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_s\}$ admet une structure de groupe multiplicatif, quotient de K par le stabilisateur de la classe τ_1 . En particulier, tous les a_i sont égaux. Soit alors f_0 une fonction algébrique définie sur la variété $\Psi(G'; \tau_1)$ et qui vérifie :

- $f_0(\tau_1) = 1$
- $f_0(\tau_i) = 0$ pour $i \in \{2, 3, \dots, s\}$.

Soit ϵ une racine primitive d'ordre s de l'unité. Posons :

$$f_1(\tau) = \sum_{i=1}^s \epsilon^{i-1} f_0(\chi_i \otimes \tau) \quad \forall \tau \in \Psi(G'; \tau_1).$$

Définissons cette fois la fonction f sur la base de Langlands de $Grot(G')$ de la façon suivante :

- 1') $f(\rho) = f_1(\rho)$ si $\rho \in \Psi(G'; \tau_1)$
- 2') $f(\rho) = 0$ si ρ est une représentation de la base de Langlands qui ne se trouve pas dans $\Psi(G'; \tau_1)$.

Remarque. Dans ce cas aussi, $f(\chi \otimes ind_{P_0}^{G'} \pi_0) = 0$ pour tout $\chi \in \Psi(G')$, tandis que $f(\tau_1) = 1 \neq 0$.

Nous allons montrer que la fonction f vérifie toujours (qu'on soit dans le premier ou le deuxième cas) les conditions de Paley-Wiener.

Lemme 2.3. *L'application f s'annule sur toute représentation induite à partir d'un sous-groupe parabolique propre de G' .*

Démonstration. Se fait en deux étapes :

Étape 1 : f s'annule sur toute induite d'une représentation essentiellement de carré intégrable d'un sous-groupe de Levi propre. (N'utilise pas l'hypothèse de récurrence.)

Soient P un sous-groupe parabolique propre de G' , $P = LU$ une décomposition de Levi de P et σ une r.e.c.i. de L . On sait (voir, par exemple, [Ba1], lemme 2.3) qu'on a deux possibilités :

- si σ est un produit du type $\sigma = \psi \otimes \sigma_u$ où ψ est la restriction à L d'un caractère Ψ de G' et σ_u est de carré intégrable, alors $ind_L^{G'} \sigma = \Psi \otimes ind_L^{G'} \sigma_u$,
- sinon $ind_L^{G'} \sigma$ est une somme de représentations de Langlands strictement induites.

Maintenant, si σ est dans la seconde situation, $f(\text{ind}_P^{G'} \sigma) = 0$ par la construction de f (condition 3) dans le premier cas et 2') dans le deuxième). Si σ est dans la première situation, alors on a encore une fois deux possibilités :

- ou bien $L = L_0^g$ pour un $g \in G'$ et il existe un caractère θ de L qui est la restriction d'un caractère Θ non ramifié de G' tel que $\sigma_u = \theta \otimes \pi_0^g$; alors, dans $\text{Grot}(G')$, on a $\text{ind}_L^{G'} \sigma_u = \Theta \otimes \text{ind}_{L_0}^{G'} \pi_0$, ce qui implique

$$f(\text{ind}_P^{G'} \sigma) = f(\Psi \otimes \text{ind}_L^{G'} \sigma_u) = f(\Psi \Theta \otimes \text{ind}_{L_0}^{G'} \pi_0) = 0$$

(voir les remarques faites plus haut sur la construction de f dans les deux cas),

- ou bien on ne se trouve pas dans cette situation ; alors les séries de composition de $\Theta \otimes \text{ind}_{P_0}^{G'}(\pi_0)$ et $\text{ind}_P^{G'} \sigma_u$ sont disjointes pour tout $\Theta \in \Psi(G')$. La suite de composition de $\text{ind}_P^{G'} \sigma_u$ est donc formée de représentations tempérées, mais ne contient aucun élément de $\cup_{i=1}^s \Psi(G'; \tau_i)$. Cela implique que la suite de composition de $\text{ind}_P^{G'} \sigma = \Psi \otimes \text{ind}_P^{G'} \sigma_u$ est formée de représentations essentiellement tempérées mais ne contient aucun élément de $\cup_{i=1}^s \Psi(G'; \tau_i)$. Donc, encore une fois, $f(\text{ind}_P^{G'} \sigma) = 0$ par la condition 3) dans le premier cas et 2') dans le deuxième cas dans la construction de f .

Étape 2 : Soit $\text{Grot}_{\text{ind}}(G')$ le sous-groupe de $\text{Grot}(G')$ engendré par toutes les représentations induites à partir de sous-groupes paraboliques propres de G' . Les représentations induites des r.e.c.i. à partir de sous-groupes paraboliques propres de G' forment une famille génératrice pour $\text{Grot}_{\text{ind}}(G')$. (Utilise l'hypothèse de récurrence.)

Remarquons que l'hypothèse de récurrence implique que pour tout sous-groupe parabolique propre P de G' qui a une décomposition de Levi $P = LU$, toute représentation tempérée de L est une représentation induite d'une représentation de carré intégrable. Par conséquent, toute représentation essentiellement tempérée de L est une représentation induite d'une représentation essentiellement de carré intégrable.

Soit $P = LU$ un sous-groupe parabolique propre de G' . La remarque plus haut vaut maintenant pour tous les sous-groupes paraboliques de L , propres ou pas cette fois. Mais l'ensemble des induites des représentations essentiellement tempérées de tous les sous-groupes paraboliques (propres ou pas) de L est une famille génératrice de $\text{Grot}(L)$ (car elle contient la base de Langlands de L). L'hypothèse de récurrence implique donc que l'ensemble des induites des r.e.c.i. de tous les sous-groupes paraboliques (propres ou pas) est aussi une famille génératrice de $\text{Grot}(L)$. Cela prouve que les représentations induites de r.e.c.i. à partir de sous-groupes paraboliques propres de G' engendrent $\text{Grot}_{\text{ind}}(G')$. $\square$

Pour vérifier les conditions de Paley-Wiener sur f , il suffit, grâce au lemme 2.3, de montrer que pour toute représentation irréductible π de G' , la restriction de f à $\Psi(G'; \pi)$ est algébrique. Pour cela, on écrit π sur la base de Langlands dans $\text{Grot}(G')$. Il y a deux types de représentations qui apparaissent dans cette écriture : des représentations essentiellement tempérées de G' et des représentations de Langlands induites strictes. Quand on fait le produit tensoriel d'une représentation de Langlands induite stricte par un caractère, on obtient toujours un élément de $\text{Grot}_{\text{ind}}(G')$. Or, on a montré que f

s'annule sur $Grot_{ind}(G')$. Donc, l'algébricité de f sur $\Psi(G'; \pi)$ se réduit à l'algébricité de f sur les variétés $\Psi(G'; \tau)$ où τ est une représentation essentiellement tempérée, qui est évidente par les conditions posées à la construction de f .

Donc f est une fonction trace par application du théorème de Paley-Wiener ([BDK]). Soit f' une fonction sur G' qui correspond à f par ce théorème.

Lemme 2.4. *L'intégrale orbitale de f' est nulle sur les éléments semisimples réguliers non elliptiques de G' .*

Démonstration. On a vu que, pour tout $\sigma \in Grot_{ind}(G')$, on avait $tr\sigma(f') = 0$. Le lemme est alors une conséquence classique en toute caractéristique (voir par exemple [Ba1], lemme 2.4). $\square$

La fonction f' annule de plus les traces de toutes les représentations essentiellement de carré intégrable, mais pas la trace de τ_1 . Montrons qu'il y a là une contradiction qui prouve que $s = 1$ (on est toujours dans la démonstration du lemme 2.2). On distingue deux cas, selon la caractéristique de F :

(a) F est de caractéristique nulle

Lemme 2.5. *L'intégrale orbitale de f' s'annule sur les éléments elliptiques réguliers de G' .*

Démonstration. Soient Z le centre de G' et ω un caractère unitaire de Z . Nous allons utiliser l'espace $L_0(G'_e; \omega)$ des fonctions f localement constantes sur l'ensemble des éléments elliptiques réguliers de G' , invariantes sous l'action de conjugaison par des éléments de G' , et vérifiant $f(zg) = \omega(z)f(g)$ pour tout $z \in Z$ et tout g elliptique régulier dans G' . On considère le sous-espace $L^2(G'_e; \omega)$ de $L_0(G'_e; \omega)$ formé des fonctions f telles que

$$\sum_{T \in \mathcal{T}_e} |W_T|^{-1} \int_{T^{reg}/Z} D(\bar{t}) |f(\bar{t})|^2 d\bar{t}$$

converge, où $\mathcal{T}_e$ est un ensemble de représentants des classes de conjugaison de tores elliptiques maximaux de G' , $|W_T|$ est le cardinal du groupe de Weyl de T , T^{reg} est l'ensemble des éléments réguliers de T , $d\bar{t}$ est choisie de façon à ce que le volume de T^{reg}/Z soit 1, et $D(\bar{t})$ est la valeur absolue normalisée du déterminant de l'opérateur $Ad(t^{-1}) - Id$ agissant sur $Lie(G')/Lie(T)$. On définit un produit scalaire dans $L^2(G'_e; \omega)$ en posant :

$$\langle f_1; f_2 \rangle_e = \sum_{T \in \mathcal{T}_e} |W_T|^{-1} \int_{T^{reg}/Z} D(\bar{t}) f_1(\bar{t}) \overline{f_2(\bar{t})} d\bar{t},$$

qui munit $L^2(G'_e; \omega)$ une structure d'espace préhilbertien.

On sait que pour toute représentation π de G' de carré intégrable et de caractère central ω , la restriction du caractère χ_π de π à G'_e se trouve dans $L^2(G'_e; \omega)$ et les éléments de $L^2(G'_e; \omega)$ ainsi obtenus forment une famille orthonormale pour $\langle ; \rangle_e$ ([Cl2]). Une conséquence de la correspondance de Jacquet-Langlands avec une algèbre à division et

que ce système est complet ([Ba2], cor. 5.13, par exemple). À partir de f' on définit f'_ω en posant, pour tout $g \in G'$,

$$f'_\omega(g) = \int_Z \omega(z) f'(zg) dz.$$

Nous avons la relation entre les intégrales orbitales

$$\Phi(f'_\omega; g) = \int_Z \omega(z) \Phi(f'; zg) dz,$$

pour tout $g \in G'$. Le lemme 2.4 entraîne donc que l'intégrale orbitale de f'_ω est nulle sur les éléments semisimples réguliers qui ne sont pas elliptiques, i.e. qui n'appartiennent pas à un tore elliptique maximal. Dans ce cas, la formule d'intégration de Weyl donne, pour toute représentation de carré intégrable π de G' de caractère central ω ,

$$tr\pi(f) = \sum_{T \in \mathcal{T}_e} |W(T)|^{-1} \int_{T^{reg}/Z} D(\bar{t}) \chi_\pi(\bar{t}) \Phi(f'_\omega; \bar{t}) d\bar{t}.$$

Or, on sait que $tr\pi(f'_\omega) = tr\pi(f') = 0$.

Lemme 2.6. *La restriction à l'ensemble des éléments elliptiques réguliers de G' de l'intégrale orbitale de f'_ω se trouve dans l'espace $L^2(G'_e; \omega^{-1})$.*

Démonstration. D'après [H-CvD], th.14, chap.8, pour tout T dans $\mathcal{T}_e$, le produit de l'intégrale orbitale de f'_ω et de la fonction $D^{\frac{1}{2}}$ est borné sur T^{reg} . Le module du carré de cette fonction est ainsi borné et donc intégrable sur T^{reg}/Z qui est de mesure 1. Comme $\mathcal{T}_e$ est fini, le résultat s'ensuit. $\square$

D'après ce qui précède, la conjuguée de $\Phi(f'_\omega; \cdot)$ est un élément de $L^2(G'_e; \omega)$ orthogonal à χ_π . C'est vrai pour toute représentation π de carré intégrable et de caractère central ω . On en déduit que $\Phi(f'_\omega; \cdot)$ est identiquement nulle sur l'ensemble des éléments elliptiques réguliers.

Soit g un élément elliptique régulier de G' . Nous avons trouvé que pour tout caractère unitaire ω de Z on a

$$\int_Z \omega(z) \Phi(f'; zg) dz = 0.$$

Par [Bo], chap. 2, th. 4.4, on en déduit que $\Phi(f'; g) = 0$. Le lemme est montré. $\square$

Les lemmes 2.4 et 2.5 impliquent que l'intégrale orbitale de f' est nulle sur l'ensemble des éléments semisimples réguliers de G' . Mais alors la trace de toute représentation de G' est nulle sur f' (nous sommes en caractéristique nulle). Cela contredit $tr(\tau_1(f')) \neq 0$. En conclusion $s = 1$ et on a $ind_{P_0}^{G'} \pi_0 = a\tau$ où a est un entier strictement positif et τ est une représentation tempérée de G' . $\square$

(b) F est de caractéristique positive

Nous avons utilisé deux résultats connus pour l'instant uniquement en caractéristique nulle dans la démonstration plus haut. Dans le cas de caractéristique non nulle, nous allons utiliser les corps proches de Kazhdan pour conclure. Soit E un corps local non

archimédien de caractéristique nulle. Notons O_F (resp. O_E) l'anneau des entiers de F (resp. E), et I_F (resp. I_E) l'idéal maximal de O_F (resp. O_E). Nous disons que E et F sont m -proches s'il existe un isomorphisme d'anneaux $\bar{\lambda}_{FE}^m$ de O_F/I_F^m sur O_E/I_E^m (pour tout m on peut trouver un tel corps E). Quand on dira par la suite que F et E sont m proches, on considèrera tacitement qu'un isomorphisme $\bar{\lambda}_{FE}^m$ est fixé une fois pour toutes. Soit E un corps m proche de F . Rebaptisons G'_F notre groupe pour rappeler qu'il est défini sur F . Nous avons $G'_F = GL_r(D_F)$ où D_F est une algèbre à division centrale sur F , de dimension finie d^2 . On note G'_E le groupe $GL_r(D_E)$ où D_E est une algèbre à division centrale sur E qui a le même invariant que D_F .

Notons O_{D_F} l'anneau des entiers de D_F , et I_{D_F} l'idéal maximal de O_{D_F} . On pose $K_{D_F}^0 = GL_r(D_F)$, et, pour tout entier strictement positif l , $K_{D_F}^l = 1 + M_r(I_{D_F}^{dl})$. On fixe sur G'_F une mesure de Haar telle que le volume de $K_{D_F}^0$ soit 1. Soit f une fonction localement constante à support compact sur G'_F . Nous définissons le *niveau* de f comme étant le plus petit entier l tel que f soit bi-invariante par $K_{D_F}^l$. Notons H_F^l l'algèbre de Hecke des fonctions localement constantes à support compact de niveau inférieur ou égal à l sur G'_F . Si π est une représentation lisse irréductible de G'_F on appelle niveau de π le plus petit entier l tel que π ait un vecteur non nul fixe sous $K_{D_F}^l$. Adoptons pour G'_E des notations et définitions analogues à celles fixées dans ce paragraphe pour G'_F .

Dans [Ba2] nous montrons que, quel que soit l'entier positif l , il existe un entier m tel que, pour tout corps E m -proche de F , $\bar{\lambda}_{FE}^m$ induise un isomorphisme d'algèbres $\bar{\zeta}_{D_F D_E}^l$ de H_F^l sur H_E^l . D'où une bijection entre l'ensemble de classes d'équivalence des représentations lisses irréductibles de G'_F de niveau inférieur ou égal à l et l'ensemble de classes d'équivalence des représentations lisses irréductibles de G'_E de niveau inférieur ou égal à l . On utilise pour cet isomorphisme la même notation $\bar{\zeta}_{D_F D_E}^l$. Nous avons

$$tr \bar{\zeta}_{D_F D_E}^l(\pi)(\bar{\zeta}_{D_F D_E}^l(f)) = tr \pi(f)$$

pour toute représentation π de G'_F de niveau inférieur ou égal à l et toute $f \in H_F^l$.

Avec les conventions faites en début de section, un sous-groupe de Levi standard L de G'_F ou G'_E est formé des matrices diagonales par blocs de taille donnée et on peut associer à L de façon biunivoque une suite ordonnée d'entiers strictement positifs $r_1, r_2, \dots, r_k$ telle que $\sum_{i=1}^k r_i = r$ où les r_i représentent les tailles de ces blocs. À un sous-groupe de Levi standard de G'_F correspond donc un unique sous-groupe de Levi standard de G'_E . C'est pareil pour les sous-groupes paraboliques standard. Si L_F est un sous-groupe de Levi standard de G'_F on note L_E le sous-groupe de Levi standard de G'_E qui lui correspond, et si P_F est un sous-groupe parabolique standard de G'_F on note P_E le sous-groupe parabolique standard de G'_E qui lui correspond. Sur chaque bloc d'un sous-groupe de Levi standard de G'_F et G'_E nous adoptons les mêmes notations et conventions que plus haut.

Soit P est un sous-groupe parabolique standard de G'_F et $P = LU$ sa décomposition de Levi (L sous-groupe de Levi standard de G'_F et U le radical unipotent de P). On

munit P et U de mesures de Haar invariantes à gauche telles que les volumes de $P \cap K_{D_F}^0$ et $U \cap K_{D_F}^0$ soient égaux à 1. On note δ_P le caractère modulaire sur P .

Pour toute fonction localement constante à support compact sur G'_F , on définit une fonction localement constante à support constant sur L , f^P , par la formule :

$$f^P(l) = \delta_P^{\frac{1}{2}}(l) \int_{K_{D_F}^0} \int_U f(k^{-1}luk) dk du$$

pour tout $l \in L$.

Les mêmes définitions s'appliquent à E .

Proposition 2.7. *Soient P_F un sous-groupe parabolique standard de G'_F et $P_F = L_F U_F$ la décomposition de Levi standard de P_F . Alors il existe un m tel que, si F et L sont m -proches, alors $\bar{\zeta}_{D_F D_E}^l(f')$ et $\bar{\zeta}_{D_F D_E}^l(f'^{P_F})$ sont bien définies et on a*

$$(\bar{\zeta}_{D_F D_E}^l(f'))^{P_E} = \bar{\zeta}_{D_F D_E}^l(f'^{P_F}).$$

Démonstration. L'analogue de cette proposition dans le cas particulier $G'_F = GL_r(F)$ est montré à la page 1053 de [Le]. La démonstration est exactement la même dans notre cas. $\square$

Nous allons relever notre situation en caractéristique nulle et utiliser (a). Soit $\mathcal{P}_F$ l'ensemble de tous les sous-groupes paraboliques standard, propres ou pas, de G'_F et soit m un entier suffisamment grand pour que, pour tout corps local E qui est m -proche de F , la proposition 2.7 plus haut soit vérifiée pour tout $P_F \in \mathcal{P}_F$ qui a une décomposition de Levi standard $P_F = L_F U_F$ (c'est possible puisque $\mathcal{P}_F$ est un ensemble fini). On a alors :

1) si P_E est un sous-groupe parabolique standard propre de G'_E , si $P_E = L_E U_E$ est une décomposition de Levi standard de P_E , si π est une représentation lisse irréductible de L_E , alors :

- ou bien le niveau de π est supérieur strictement à l et alors

$$\text{tr} \pi(\bar{\zeta}_{D_F D_E}^l(f'^{P_F})) = 0,$$

- ou bien le niveau de π est inférieur ou égal à l et alors, en supposant que σ est la représentation lisse irréductible de L_F qui vérifie $\bar{\zeta}_{D_F D_E}^l(\sigma) = \pi$ on peut écrire :

$$\text{tr} \pi(\bar{\zeta}_{D_F D_E}^l(f'^{P_F})) = \text{tr} \sigma(f'^{P_F}) = \text{tr}(\text{ind}_{P_F}^{G'_F} \sigma)(f') = 0$$

car f' annule la trace de toute représentation de $\text{Grot}_{\text{ind}}(G'_F)$.

Dans les deux cas on obtient $\text{tr} \pi(\bar{\zeta}_{D_F D_E}^l(f'^{P_F})) = 0$ ce qui implique, compte tenu de la proposition 2.7 plus haut, que

$$\text{tr}(\text{ind}_{P_E}^{G'_E} \pi)(\bar{\zeta}_{D_F D_E}^l(f')) = 0.$$

Finalement, on a trouvé que $\bar{\zeta}_{D_F D_E}^l(f')$ est une fonction qui annule la trace de toute représentation dans $\text{Grot}_{\text{ind}}(G'_E)$.

2) si π est une r.e.c.i. de G_E , alors ou bien son niveau est supérieur strictement à l et donc $\text{tr}\pi(\bar{\zeta}_{D_F D_E}^l(f')) = 0$ ou bien son niveau est inférieur ou égal à l et alors, en supposant que σ est la représentation lisse irréductible de G'_F qui vérifie $\bar{\zeta}_{D_F D_E}^l(\sigma) = \pi$ on a que σ est une r.e.c.i. (th. 2.16.b dans [Ba2]) et par conséquent

$$\text{tr}\pi(\bar{\zeta}_{D_F D_E}^l(f')) = \text{tr}\sigma(f') = 0,$$

car f' annule la trace de toute r.e.c.i. de G'_F . Finalement, on a trouvé que $\bar{\zeta}_{D_F D_E}^l(f')$ annule la trace de toute r.e.c.i. de G'_E .

Or, E est de caractéristique nulle. Par les points 1) et 2) ci-dessus et par le raisonnement déjà fait en caractéristique nulle, on en déduit que $\bar{\zeta}_{D_F D_E}^l(f')$ annule la trace de toutes les représentations de G'_E . D'autre part, comme $\text{tr}\tau_1(f') \neq 0$, le niveau de τ_1 est inférieur ou égal à l et donc $\bar{\zeta}_{D_F D_E}^l(\tau_1)$ est bien défini et

$$\text{tr}\bar{\zeta}_{D_F D_E}^l(\tau_1)(\bar{\zeta}_{D_F D_E}^l(f')) = \text{tr}\tau_1(f') \neq 0.$$

Contradiction. On trouve donc, comme en caractéristique nulle, que $s = 1$ et on a $\text{ind}_{P_0}^{G'} \pi_0 = a\tau$ où a est un entier strictement positif et τ est une représentation tempérée de G' . $\square$

Le fait que $a = 1$ se montre exactement de la même façon que les étapes (2) et (3) de la preuve de la proposition 27 de [FK], page 98. Le th. 2.1 est démontré.

3. (UNE) CORRESPONDANCE DE JACQUET-LANGLANDS GÉNÉRALISÉE

3.1. Correspondance entre les groupes de Grothendieck. Dans cette sous-section F est un corps local non archimédien, D est une algèbre à division centrale sur F de dimension d^2 , r est un entier strictement positif, $n = rd$, $G = GL_n(F)$ et $G' = GL_r(D)$. Rappelons que, si g est un élément de G ou de G' on dit que g est *semisimple régulier* si son polynôme caractéristique est séparable (valeurs propres distinctes dans une clôture algébrique de F). Si $g \in G$ et $g' \in G'$ on dit que g et g' *se correspondent* s'ils sont semisimples réguliers et ont le même polynôme caractéristique. Rappelons maintenant l'énoncé de la correspondance de Jacquet-Langlands : *il existe une unique correspondance bijective $\mathbf{C}$ de l'ensemble des classes d'équivalence de r.e.c.i. de G sur l'ensemble des classes d'équivalence de r.e.c.i. de G' qui vérifie, pour toute r.e.c.i. π de G :*

$$\chi_\pi(g) = (-1)^{n-r} \chi_{\mathbf{C}(\pi)}(g')$$

pour tout g et g' qui se correspondent. Sur G comme sur G' fonctionnent les conventions faites à la section précédente pour une forme intérieure de G quelconque. Avec ces conventions, à un sous-groupe de Levi standard de G' correspond un unique sous-groupe de Levi standard de G et à un sous-groupe parabolique standard de G' correspond un unique sous-groupe parabolique standard de G . Si L' est un sous-groupe de Levi standard de G' et L est le sous-groupe de Levi standard de G qui lui correspond, L' est un produit de groupes du type $GL_k(D)$ et L est le produit des groupes du type $GL_{dk}(F)$ qui leur correspondent. Si L est de ce type, on dit que l *se transfère*. Ces définitions s'étendent facilement aux sous-groupes paraboliques standard. La correspondance de Jacquet-Langlands induit une correspondance entre les r.e.c.i. de L et les r.e.c.i. de L' .

Nous noterons cette correspondance aussi $\mathbf{C}$, quand il n'y aura pas d'ambiguïté.

Proposition 3.1. *Soit $\mathcal{B}_G$ le sous-ensemble de $\text{Grot}(G)$ formé des induites de r.e.c.i. de tous les sous-groupes paraboliques standard de G . Alors $\mathcal{B}_G$ n'est autre que la base de Langlands de $\text{Grot}(G)$. Soit $\mathcal{B}_{G'}$ le sous-ensemble de $\text{Grot}(G')$ formé des induites de r.e.c.i. de tous les sous-groupes paraboliques standard de G' . Alors $\mathcal{B}_{G'}$ n'est autre que la base de Langlands de $\text{Grot}(G')$.*

Démonstration. Le fait que $\mathcal{B}_G$ soit une base de $\text{Grot}(G)$ apparaît dans [Ze] sans que le fait que ce soit exactement la base de Langlands y soit dit explicitement. Ce résultat est conséquence directe du fait que les induites des représentations de carré intégrable sont irréductibles et la démonstration est la même sur les deux groupes. Voir [Ta], prop. 2.1 pour le cas général de G' . $\square$

Soit $\mathbf{JL}_r$ l'application définie sur $\mathcal{B}_{G'}$ à valeurs dans $\text{Grot}(G)$ de la façon suivante : soient P' un sous-groupe parabolique standard (propre ou pas) de G' , L' le sous-groupe de Levi standard de P' et σ une r.e.c.i. de L' ; soient P le sous-groupe parabolique standard de G qui correspond à P' , L le sous-groupe de Levi standard de P (L correspond à L') et σ la r.e.c.i. de L qui vérifie $\mathbf{C}(\sigma) = \sigma'$; on pose

$$\mathbf{JL}_r(\text{ind}_{P'}^{G'} \sigma') = \text{ind}_P^G \sigma.$$

Grâce à la proposition précédente, $\mathbf{JL}_r$ s'étend de façon unique en un morphisme injectif de $\mathbb{Z}$ -modules de $\text{Grot}(G')$ dans $\text{Grot}(G)$.

Théorème 3.2. a) *Le morphisme injectif de $\mathbb{Z}$ -modules*

$$\mathbf{JL}_r : \text{Grot}(G') \rightarrow \text{Grot}(G),$$

commute à la tensorisation avec des caractères, et on a

$$\chi_{\pi'}(g') = (-1)^{n-r} \chi_{\mathbf{JL}_r(\pi')}(g)$$

pour tout $g \in G$ et $g' \in G'$ qui se correspondent.

b) *Le morphisme $\mathbf{JL}_r$ réalise une bijection*

- *entre l'ensemble des classes de représentations de carré intégrable de G' et l'ensemble de classes de représentations de carré intégrable de G , ainsi qu'entre l'ensemble des classes de r.e.c.i. de G' et l'ensemble des classes de r.e.c.i. de G (l'application inverse n'est autre que $\mathbf{C}$),*

- *entre l'ensemble des classes de représentations tempérées de G' et l'ensemble des classes de représentations tempérées de G qui sont des induites de représentations de carré intégrable de sous-groupes paraboliques de G qui se transfèrent,*

- *entre l'ensemble des classes de représentations cuspidales de G' et l'ensemble de classes de r.e.c.i. de G dont la restriction de Jacquet à tout sous-groupe parabolique qui se transfère est nulle.*

c) *Soit $\mathbf{S}_{G,G'}$ le sous-module de $\text{Grot}(G)$ engendré par l'ensemble des représentations induites de r.e.c.i. de tous les sous-groupes paraboliques de G qui ne se transfèrent pas. Alors $\mathbf{S}_{G,G'}$ est un supplémentaire de l'image*

$Im(\mathbf{JL}_r)$ de $\mathbf{JL}_r$ dans $Grot(G)$ et $\mathbf{JL}_r$ induit un isomorphisme de groupes

$$\overline{\mathbf{JL}_r} : Grot(G') \simeq Grot(G)/\mathbf{S}_{G,G'}.$$

Démonstration. a) Soient $g \in G$ et $g' \in G'$ qui se correspondent. Pour vérifier qu'on a

$$\chi_{\pi'}(g') = (-1)^{n-r} \chi_{\mathbf{JL}_r(\pi')}(g) \quad \forall g \leftrightarrow g'$$

pour tout $\pi' \in Grot(G')$ il suffit de le vérifier pour tout $\pi' \in \mathcal{B}_{G'}$. Si π' est une r.e.c.i. on a $\mathbf{JL}_r(\pi') = \mathbf{C}^{-1}(\pi')$ et c'est évident. Si π' est l'induite d'une r.e.c.i. à partir d'un sous-groupe parabolique propre, cela résulte de la définition de $\mathbf{JL}_r(\pi')$ et de la formule du caractère d'une représentation induite ([vD] ou [Cl1], prop. 3).

Pour montrer que $\mathbf{JL}_r$ commute à la tensorisation avec des caractères il suffit de le montrer sur la base $\mathcal{B}_{G'}$. Soit χ un caractère de G' . Si $\pi' = ind_{P'}^{G'} \sigma'$, où P' est un sous-groupe parabolique standard de G' et σ' est une r.e.c.i. du sous-groupe de Levi standard L' de P' , alors on a

$$\chi \otimes \pi' = ind_{P'}^{G'}((res_{P'}^{G'} \chi) \otimes \sigma').$$

Or, $(res_{P'}^{G'} \chi) \otimes \sigma'$ est une r.e.c.i. de L' . Soient P le sous-groupe parabolique standard de G correspondant à P' , L son sous-groupe de Levi standard et σ la r.e.c.i. de L qui correspond à σ' par la correspondance entre L et L' . On a alors par définition de $\mathbf{JL}_r$:

$$\mathbf{JL}_r(ind_{P'}^{G'}((res_{P'}^{G'} \chi) \otimes \sigma')) = ind_P^G((res_P^G \chi) \otimes \sigma).$$

On en déduit que

$$\mathbf{JL}_r(\chi \otimes \pi') = \mathbf{JL}_r(ind_{P'}^{G'}((res_{P'}^{G'} \chi) \otimes \sigma')) = ind_P^G((res_P^G \chi) \otimes \sigma) =$$

$$\chi \otimes ind_P^G \sigma = \chi \otimes \mathbf{JL}_r(ind_{P'}^{G'} \sigma') = \chi \otimes \mathbf{JL}_r(\pi').$$

b) L'assertion sur les r.e.c.i. est la correspondance de Jacquet-Langlands classique. L'assertion sur les représentations de carré intégrable en résulte puisque $\mathbf{C}$ conserve le caractère central et une r.e.c.i. est de carré intégrable si et seulement si son caractère central est unitaire. Les représentations tempérées de G' sont exactement les induites de représentations de carré intégrable des sous-groupes paraboliques (propres ou pas) et l'assertion sur les représentations tempérées est immédiate. La partie concernant les représentations cuspidales est le théorème B.2.b de [DKV] (l'argument marche aussi en caractéristique non nulle, voir [Ba2], prop. A, page 53).

c) Le fait que $\mathbf{S}_{G,G'}$ est un sous-module supplémentaire de $Im(\mathbf{JL}_r)$ dans $Grot(G)$ est une conséquence immédiate du fait que $\mathbf{JL}_r(\mathcal{B}_{G'}) \subset \mathcal{B}_G$ et $\mathcal{B}_G \setminus \mathbf{JL}_r(\mathcal{B}_{G'})$ est par définition une base de $\mathbf{S}_{G,G'}$. Le fait que le morphisme de $\mathbb{Z}$ -modules $Grot(G') \rightarrow Grot(G)/\mathbf{S}_{G,G'}$ obtenu par composition de la projection $Grot(G) \rightarrow Grot(G)/\mathbf{S}_{G,G'}$ avec $\mathbf{JL}_r$ est un isomorphisme s'ensuit, parce que $\mathbf{JL}_r$ est injectif et réalise donc une

bijection de $Grot(G')$ sur son image. $\square$

Commentaires.

1) Le morphisme $\mathbf{JL}_r$ n'envoie pas toute représentation cuspidale de G' sur une représentation cuspidale de G . C'est le cas si et seulement si l'ensemble des nombres premiers qui divisent n coïncide avec l'ensemble des nombres premiers qui divisent r .

2) Le morphisme $\mathbf{JL}_r$ n'envoie pas toute représentation irréductible de G' sur une représentation irréductible de G , sauf si $d = 1$ ou $r = 1$. Donons un contre-exemple qui se généralise facilement. Soient $n = 4$, $d = r = 2$, L' le tore diagonal de $G' = GL_2(D)$ et L le sous-groupe de Levi standard de $G = GL_4(F)$ qui lui correspond. Soit ρ un caractère de F . En utilisant les notations de [Ze], considérons la r.e.c.i. σ de L :

$$\sigma = \langle [\rho; \nu\rho] \rangle^t \otimes \langle [\nu\rho; \nu^2\rho] \rangle^t$$

(ν est le caractère valeur absolue du déterminant, $\langle [\rho; \nu\rho] \rangle^t$ est la r.e.c.i. associée au segment $[\rho; \nu\rho]$ etc.). Le théorème 9.7 de [Ze] implique que la représentation induite de σ à G est réductible, puisque les segments $[\rho; \nu\rho]$ et $[\nu\rho; \nu^2\rho]$ sont liés. Soit σ' la r.e.c.i. de L' qui correspond à σ . Alors le lemme 2.5 de [Ta] implique que la représentation induite de σ' à G' est irréductible parce que $d = 2$ ne divise pas la longueur du segment $[\rho; \nu\rho] \cap [\nu\rho; \nu^2\rho] = [\nu\rho; \nu\rho]$.

On peut donc dire qu'en général, à une représentation irréductible π de G' correspond une combinaison linéaire à coefficients dans $\mathbb{Z}$ de représentations irréductibles de G .

3) Le théorème 3.2 implique que, si D et D' sont deux algèbres à division de même dimension sur F , si r est un entier strictement positif, il y a un *unique* isomorphisme

$$f : Grot(GL_r(D)) \simeq Grot(GL_r(D'))$$

tel que pour tout $\pi \in Grot(D)$ on ait :

$$\chi_\pi(g) = \chi_{f(\pi)}(g')$$

pour tout $g \in GL_r(D)$ et tout $g' \in GL_r(D')$ semisimples réguliers qui ont le même polynôme caractéristique. Une question intéressante serait de savoir si cette fois, la correspondance f envoie une représentation irréductible sur une représentation irréductible. Cela n'a pas l'air évident, même si le théorème 3.6 de la sous-section suivante implique que la correspondance f commute avec l'induction et la restriction, ainsi qu'avec l'involution définie par A.-M. Aubert ([Au]).

4) En définissant le morphisme $\mathbf{JL}_r$ ainsi on a fait le choix (naturel d'un certain point de vue) de privilégier les représentations de carré intégrable. En effet, les propriétés imposées au point a) du théorème ne caractérisent pas le morphisme $\mathbf{JL}_r$, et même les propriétés imposées aux points a) et b) ne le caractérisent pas non plus. En regardant "dans l'autre sens" on obtient le résultat suivant plus naturel d'un autre point de vue puisqu'il est assorti d'"unicité" :

Proposition 3.3. *Il existe un unique morphisme de $\mathbb{Z}$ -modules*

$$\mathbf{LJ}_r : \text{Grot}(G) \rightarrow \text{Grot}(G')$$

tel que, pour tout $\pi' \in \text{Grot}(G')$, l'image réciproque de π' par $\mathbf{LJ}_r$ est l'ensemble de tous les $\pi \in \text{Grot}(G)$ qui vérifient :

$$\chi_\pi(g) = (-1)^{n-r} \chi_{\pi'}(g')$$

pour tout $g \in G$ et $g' \in G'$ qui se correspondent. Le morphisme $\mathbf{LJ}_r$ est surjectif. Son noyau est $\mathbf{S}_{G,G'}$.

Disons qu'un élément de $\text{Grot}(G)$ est $G' - \text{nul}$ si son caractère est nul sur tout élément semisimple régulier qui a un correspondant dans G' . L'ensemble des éléments $G' - \text{nuls}$ dans $\text{Grot}(G)$ n'est autre que $\mathbf{S}_{G,G'}$.

3.2. Correspondance entre les algèbres de Hopf. Dans cette sous-section, F désigne un corps local non archimédien et D une algèbre à division centrale sur F , de dimension d^2 .

Soit n un entier strictement positif. Soit G l'un des groupes $GL_n(F)$ ou $GL_n(D)$. Rappelons que, si L est un sous-groupe de Levi standard de G , alors il existe une partition $A_1 \amalg A_2 \amalg \dots \amalg A_k$ de l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$ où $A_1 = \{1, 2, \dots, n_1\}$, $A_2 = \{n_1 + 1, n_1 + 2, \dots, n_1 + n_2\}$ etc. telle que L soit l'ensemble des matrices $M = (m_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in G$ telles que m_{ij} est nul si $(i, j) \notin \cup_{i=1}^k A_i \times A_i$. On appelle les ensembles ordonnés $A_1, A_2, \dots, A_k$ les *sections* de L et on pose aussi $|L| = n - k - 1$. Maintenant, si L_1 et L_2 sont deux sous-groupes de Levi standard de G , on note $W(L_1, L_2)$ le sous-groupe de $W(G)$ formé des éléments w qui vérifient :

- $w(k) < w(l)$ si $k < l$ et k et l sont dans la même section de L_1
- $w^{-1}(k) < w^{-1}(l)$ si $k < l$ et k et l sont dans la même section de L_2 .

Si $w \in W(L_1, L_2)$, alors ${}^w L_1 \cap L_2$ et $L_1 \cap L_2^w$ sont des sous-groupes de Levi standard de G . Dans ce qui suit, on n'utilise les foncteurs d'induction et de restriction qu'à partir de sous-groupes paraboliques standard de G qui vont donc être déterminés par leur sous-groupes de Levi standard. On adopte donc les notations de [Au] : si L_1 et L_2 sont deux sous-groupes de Levi standard de G tels que $L_1 \subset L_2$, alors on pose $\mathbf{i}_{L_1}^{L_2} = \text{ind}_{P_1}^{P_2}$ et $\mathbf{r}_{L_1}^{L_2} = \text{res}_{P_1}^{P_2}$ où P_1 et P_2 sont les sous-groupes paraboliques standard qui ont pour sous-groupes de Levi standard L_1 et L_2 respectivement.

Rappelons ici sous forme d'un lemme le théorème 1.2 de [Ze], résultat qui nous sera utile par la suite :

Lemme 3.4. *Soient L_1 et L_2 deux sous-groupes de Levi standard de G . Soit π une représentation de L_1 . On a alors :*

$$\mathbf{r}_{L_2}^G \mathbf{i}_{L_1}^G \pi = \sum_{w \in W(L_1, L_2)} \mathbf{i}_{w L_1 \cap L_2} ((\mathbf{r}_{L_1 \cap L_2^w} \pi)^w).$$

Posons

$$\mathcal{R}(F) = \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} \text{Grot}(GL_n(F))$$

où, par convention, pour $n = 0$ on met $GL_n(F) = \mathbb{Z} = \text{Grot}(GL_n(F))$. Si L est un sous-groupe de Levi standard de $GL_n(F)$ à k blocs, on considérera $\mathbf{r}_L^G$ comme une application linéaire de $\text{Grot}(GL_n(F))$ à valeurs dans $\otimes^k \mathcal{R}(F)$.

A. Zelevinski a muni l'espace vectoriel $\mathcal{R}(F)$ d'une multiplication m et une comultiplication c qui en font une algèbre de Hopf graduée ([Ze]). Avec les notations et conventions plus haut, la multiplication et la comultiplication de Zelevinski se définissent de la façon suivante :

- si $\pi_k \in \text{Grot}(GL_k(F))$ et $\pi_{k'} \in \text{Grot}(GL_{k'}(F))$, alors on identifie $GL_k(F) \times GL_{k'}(F)$ avec le sous-groupe de Levi standard L de $GL_{k+k'}(F)$ de blocs diagonaux de taille k puis k' et on pose

$$m(\pi_k; \pi_{k'}) = \mathbf{i}_L^G(\pi_k \otimes \pi_{k'})$$

et on étend par bilinéarité à une application de $\mathcal{R}(F) \otimes \mathcal{R}(F)$ à valeurs dans $\mathcal{R}(F)$.

- si $\pi \in \text{Grot}(GL_n(F))$, on identifie $GL_k(F) \times GL_{k'}(F)$, $k + k' = n$, à un sous-groupe de Levi standard maximal de $GL_n(F)$, $L_{k,k'}$, et on pose

$$c(\pi) = \sum_{k+k'=n} \mathbf{r}_{L_{k,k'}}^{GL_n(F)} \pi ;$$

on étend ensuite par linéarité à une application de $\mathcal{R}(F)$ à valeurs dans $\mathcal{R}(F) \otimes \mathcal{R}(F)$.

Exactement de la même façon on peut poser

$$\mathcal{R}(D) = \bigoplus_{r \in \mathbb{N}} \text{Grot}(GL_r(D)).$$

Si L est un sous-groupe de Levi standard de $GL_r(D)$ à k blocs, on regarde $\mathbf{r}_L^G$ comme une application linéaire de $\text{Grot}(GL_r(D))$ à valeurs dans $\otimes^k \mathcal{R}(D)$. On peut munir l'espace vectoriel $\mathcal{R}(D)$ d'une multiplication m' et une comultiplication c' définies comme plus haut et vérifier comme dans [Ze] qu'on obtient ainsi une algèbre de Hopf graduée (voir [Ta]). Si H est l'un des groupes étudiés ici, notons $\Pi^2(H)$ l'ensemble des classes d'équivalence de r.e.c.i. de H .

Proposition 3.5. *En tant qu'anneau, $\mathcal{R}(F)$ est isomorphe à l'anneau de polynômes en une infinité de variables commutatives $\mathbb{Z}[\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Pi^2(GL_n(F))]$ et, toujours en tant qu'anneau, $\mathcal{R}(D)$ est isomorphe à l'anneau de polynômes en une infinité de variables commutatives $\mathbb{Z}[\bigcup_{r \in \mathbb{N}} \Pi^2(GL_r(D))]$.*

Démonstration. Pour $\mathcal{R}(F)$, cette proposition est une conséquence du corollaire 7.5, du théorème 9.3, et de la proposition 9.16 de [Ze]. Voir [Ta], prop. 2.1 pour le cas général $\mathcal{R}(D)$. Autant pour $\mathcal{R}(F)$ que pour $\mathcal{R}(D)$ c'est une conséquence immédiate de la proposition 3.1. $\square$

Théorème 3.6. a) *L'ensemble des morphismes injectifs de $\mathbb{Z}$ -modules*

$$\mathbf{JL}_r : \text{Grot}(GL_r(D)) \rightarrow \text{Grot}(GL_{rd}(F))$$

pour tout r induit un morphisme injectif d'anneaux

$$\mathbf{JL} : \mathcal{R}(D) \rightarrow \mathcal{R}(F).$$

b) *L'image de $\mathbf{JL}$ est le sous-anneau de $\mathcal{R}(F)$ engendré par les r.e.c.i. de tous les $GL_n(F)$ tels que d divise n . L'idéal $\mathbf{I}_{F,D}$ de l'anneau $\mathcal{R}(F)$ engendré par les r.e.c.i. de tous les $GL_n(F)$ tels que d ne divise pas n est un $\mathbb{Z}$ -module supplémentaire de l'image de $\mathbf{JL}$ dans $\mathcal{R}(F)$.*

c) *La comultiplication de $\mathcal{R}(F)$ induit une opération bien définie sur l'anneau $\mathcal{R}(F)/\mathbf{I}_{F,D}$. L'anneau $\mathcal{R}(F)/\mathbf{I}_{F,D}$ hérite ainsi d'une structure d'algèbre de Hopf. L'application $\mathbf{JL}$ induit un isomorphisme d'algèbres de Hopf*

$$\mathbf{JLH} : \mathcal{R}(D) \simeq \mathcal{R}(F)/\mathbf{I}_{F,D}.$$

Démonstration. a) Pour tout entier positif r , $\mathbf{JL}_r$ induit une bijection de $\Pi^2(GL_r(D))$ sur $\Pi^2(GL_{rd}(F))$. La proposition 3.5 implique que cette restriction de $\mathbf{JL}_r$ aux r.e.c.i. pour tout r induit un unique morphisme d'anneaux $\mathbf{JL}$ de $\mathcal{R}(D)$ dans $\mathcal{R}(F)$, qui de plus est injectif. On doit prouver que pour tout r l'application $\mathbf{JL}$ coïncide avec $\mathbf{JL}_r$ sur $\text{Grot}(GL_r(D))$ tout entier. Par la proposition 3.1 et par linéarité des deux applications, il suffit de vérifier que pour deux r.e.c.i. π'_1 de $GL_{r_1}(D)$ et π'_2 de $GL_{r_2}(D)$, on a

$$m(\mathbf{JL}_{r_1}(\pi'_1); \mathbf{JL}_{r_2}(\pi'_2)) = \mathbf{JL}_{r_1+r_2}(m'(\pi'_1; \pi'_2)).$$

Mais cela fait partie de la définition même de $\mathbf{JL}_{r_1+r_2}$.

b) Partant de la définition de $\mathbf{JL}$, le fait que l'image de $\mathbf{JL}$ est le sous-anneau de $\mathcal{R}(F)$ engendré par les r.e.c.i. de tous les $GL_n(F)$ tels que d divise n est tautologique. En écrivant maintenant

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Pi^2(GL_n(F)) = \left(\bigcup_{d|n} \Pi^2(GL_n(F)) \right) \bigcup \left(\bigcup_{d \nmid n} \Pi^2(GL_n(F)) \right),$$

on a que tout polynôme en les variables $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Pi^2(GL_n(F))$ s'écrit de façon unique comme la somme d'un polynôme en les variables $\bigcup_{d|n} \Pi^2(GL_n(F))$ et un polynôme dont chaque monôme contient au moins une variable se trouvant dans l'ensemble $\bigcup_{d \nmid n} \Pi^2(GL_n(F))$. On en déduit l'égalité de $\mathbb{Z}$ -modules :

$$\mathcal{R}(F) = \text{Im}(\mathbf{JL}) \oplus \mathbf{I}_{F,D}.$$

c) Par le point b) le morphisme injectif d'anneaux $\mathbf{JL} : \mathcal{R}(D) \rightarrow \mathcal{R}(F)$ induit un isomorphisme d'anneaux $\mathbf{JLH} : \mathcal{R}(G') \rightarrow \mathcal{R}(F)/\mathbf{I}_{F,D}$. Il suffit de montrer que la comultiplication c de $\mathcal{R}(F)$ "passe au quotient" et que $\mathbf{JLH}$ commute à la comultiplication. Reprenons les notations de la sous-section précédente : $r \in \mathbb{N}^*$, $G' = GL_r(D)$ et $G = GL_{rd}(F)$. On va étudier l'effet du foncteur restriction sur les bases $\mathcal{B}_G$ et $\mathcal{B}_{G'}$. On commence par les r.e.c.i..

Dans ce qui suit on suppose que le lecteur est un peu familiarisé avec les travaux de Bernstein et Zelevinski présentés dans [Ze].

Lemme 3.7. *a) Soit σ une r.e.c.i. de G qui correspond à un segment $[\rho; \nu^{k-1}\rho]$ de Zelevinski. Soit L un sous-groupe de Levi standard de G . Alors $\mathbf{r}_L^G \sigma$ est la représentation nulle si l'entier n/k ne divise pas la taille de tous les blocs de L et $\mathbf{r}_L^G \sigma$ est une r.e.c.i. de L si l'entier n/k divise la taille de tous les blocs de L .*

b) Soient σ' une r.e.c.i. de G' et L' un sous-groupe de Levi standard de G' . Posons $\sigma = \mathbf{JL}_r(\sigma')$. Supposons que la r.e.c.i. σ de G correspond à un segment $[\rho; \nu^{k-1}\rho]$. Soit L le sous-groupe de Levi standard de G qui correspond à L' . Alors $\mathbf{r}_{L'}^{G'} \sigma'$ est la représentation nulle si l'entier n/k ne divise pas la taille de tous les blocs de L et $\mathbf{r}_{L'}^{G'} \sigma'$ est une r.e.c.i. de L' si l'entier n/k divise la taille de tous les blocs de L . $\mathbf{r}_{L'}^{G'} \sigma'$ et $\mathbf{r}_L^G \sigma$ se correspondent par $\mathbf{C}$.

Démonstration. Le point a) est la proposition 9.5 de [Ze]. Le point b) est alors la conséquence directe de [DKV], th. B.2.b. $\square$

Appliquons maintenant le lemme 3.4 à un élément π de $\mathcal{B}_G$. On a $\pi = \mathbf{i}_{L_1}^G \sigma$ où σ est une r.e.c.i. du sous-groupe de Levi standard L_1 de G . Soit L_2 un autre sous-groupe de Levi standard de G . On a alors

$$\mathbf{r}_{L_2}^G \pi = \mathbf{r}_{L_2}^G \mathbf{i}_{L_1}^G \sigma = \sum_{w \in W(L_1, L_2)} \mathbf{i}_{w L_1 \cap L_2} ((\mathbf{r}_{L_1 \cap L_2^w} \sigma)^w).$$

Le lemme 3.7 implique alors que $\mathbf{r}_{L_2}^G \pi$ est une somme de représentations de L_2 qui sont des induites de r.e.c.i. de sous-groupes de Levi standard de L_2 du type ${}^w L_1 \cap L_2$. Notons $W(L_1; L_2)_d$ l'ensemble des éléments $w \in W(L_1; L_2)$ tels que ${}^w L_1 \cap L_2$ se transfère (i.e. que d divise le cardinal de toutes ses sections). Écrivons

$$(3.1) \quad \mathbf{r}_{L_2}^G \pi = \mathbf{r}_{L_2}^G \mathbf{i}_{L_1}^G \sigma = \sum_{w \in W(L_1, L_2)_d} \mathbf{i}_{w L_1 \cap L_2} ({}^w (\mathbf{r}_{L_1 \cap L_2^w} \sigma)) + \sum_{w \in W(L_1, L_2) \setminus W(L_1, L_2)_d} \mathbf{i}_{w L_1 \cap L_2} ({}^w (\mathbf{r}_{L_1 \cap L_2^w} \sigma))$$

D'abord, si L_1 ou L_2 ne se transfère pas, alors $W(L_1; L_2)_d = \emptyset$ parce qu'un sous-groupe de Levi standard qui ne se transfère pas ne peut pas contenir un sous-groupe de Levi standard qui se transfère.

C'est le cas en particulier si L_1 ne se transfère pas (i.e. $\pi \in \mathcal{B}_G \setminus \mathbf{JL}_r(\mathcal{B}_{G'})$). On trouve donc dans ce cas que $\mathbf{r}_{L_2}^G \pi$ est la somme des induites de r.e.c.i. de sous-groupes de Levi standard de L_2 qui ne se transfèrent pas. Cela veut dire que, si L_2 a k -blocs, l'image de $\mathbf{r}_{L_2}^G : \mathcal{R}(F) \rightarrow \otimes^k \mathcal{R}(F)$ est incluse dans le sous-espace

$$\sum_{i=0}^{k-1} [\otimes^i \mathcal{R}(F) \otimes \mathbf{I}_{F,D} \otimes^{k-1-i} \mathcal{R}(F)]$$

de $\otimes^k \mathcal{R}(F)$.

En particulier, en appliquant la définition de c on trouve que

$$c(\pi) \in \mathcal{R}(F) \otimes \mathbf{I}_{F,D} + \mathbf{I}_{F,D} \otimes \mathcal{R}(F).$$

Puisque π est un élément quelconque de $\mathcal{B}_G \setminus \mathbf{JL}_r(\mathcal{B}_{G'})$ cela implique que la comultiplication “passe au quotient” dans $\mathcal{R}(F)/\mathbf{I}_{F,D}$. On note $\bar{c}$ la comultiplication de $\mathcal{R}(F)/\mathbf{I}_{F,D}$ induite par c .

Étudions maintenant le cas où L_1 se transfère, i.e. $\pi \in \mathbf{JL}(\mathcal{B}_{G'})$. Par la formule 3.1, si π est un élément de $\mathbf{JL}_r(\mathcal{B}_{G'})$, si L_2 a k sections, dans $\otimes^k[\mathcal{R}(F)/\mathbf{I}_{F,D}]$ on a :

$$(*) \quad \mathbf{r}_{L_2}^G \pi = \sum_{w \in W(L_1, L_2)_d} \mathbf{i}_{w L_1 \cap L_2} \left({}^w(\mathbf{r}_{L_1 \cap L_2^w} \sigma) \right).$$

Si L_2 ne se transfère pas, on a vu que $W(L_1, L_2)_d$ était vide et donc

$$(**) \quad \mathbf{r}_{L_2}^G \pi = 0 \text{ dans } \otimes^k[\mathcal{R}(F)/\mathbf{I}_{F,D}].$$

Si L_2 se transfère, adoptons les notations suivantes :

- soit L'_1 le sous-groupe de Levi standard de G' correspondant à L_1 ,
- soit L'_2 le sous-groupe de Levi standard de G' correspondant à L_2 ,
- soit π' l'élément de $\text{Grot}(G')$ correspondant à π ; autrement dit, π' est l'induite de L'_1 à G' de σ' où σ' est la r.e.c.i. de L'_1 qui correspond à σ par la correspondance entre L_1 et L'_1 .

On a par le lemme 3.4 :

$$(**) \quad \mathbf{r}_{L'_2}^{G'} \pi' = \sum_{w \in W(L'_1, L'_2)} \mathbf{i}_{w L'_1 \cap L'_2} \left({}^w(\mathbf{r}_{L'_1 \cap L'_2^w} \sigma') \right).$$

Maintenant, il existe une inclusion standard t de $W(L'_1; L'_2)$ dans $W(L_1; L_2)$. Elle est définie de la façon suivante. On regarde les éléments de $W(L'_1; L'_2)$ comme des permutations de l'ensemble $\{1, 2 \dots r\}$ et les éléments de $W(L_1; L_2)$ comme des permutations de l'ensemble $\{1, 2 \dots n\}$ comme on l'a expliqué au debut de cette sous-section. Soit τ' une permutation dans $W(L'_1; L'_2)$. Pour tout élément x de l'ensemble $\{1, 2 \dots n\}$ il existe un unique couple $(a; b) \in \{1, 2 \dots r\} \times \{0, 1 \dots d-1\}$ tel qu'on ait

$$x = ad - b.$$

On pose alors

$$\tau(x) = \tau'(a)d - b.$$

On obtient ainsi une permutation τ de l'ensemble $\{1, 2 \dots n\}$ et on pose

$$t(\tau') = \tau.$$

En fait, $t(\tau)$ est la permutation de l'ensemble $\{1, 2 \dots n\}$ qui permute les r sous-ensembles $\{1, 2 \dots d\}$, $\{d+1, d+2 \dots 2d\}$, $\dots \{(r-1)d+1, (r-1)d+2 \dots n\}$ selon la permutation τ' tout en laissant l'ordre inchangé à l'intérieur de chacun de ces sous-ensembles. L'application clairement injective

$$t : W(L'_1; L'_2) \rightarrow W(L_1; L_2)$$

ainsi définie a la propriété que pour tout $w \in W(L'_1; L'_2)$, les sous-groupes de Levi standard ${}^w L'_1 \cap L'_2$ et ${}^{t(w)} L_1 \cap L_2$ se correspondent (et pareil pour $L'_1 \cap L_2^w$ et $L_1 \cap L_2^{t(w)}$). Ainsi, l'image par t de $W(L'_1; L'_2)$ est incluse dans $W(L_1; L_2)_d$. Le but du jeu est maintenant de montrer que l'image par t de $W(L'_1; L'_2)$ est en fait $W(L_1; L_2)_d$. Cela

donnera l'égalité entre les membres droits des formules 3.1 et (**), grâce au lemme 3.7 b).

On doit montrer que, si $w \in W(L_1; L_2)_d$ alors la permutation w de l'ensemble $\{1, 2 \dots n\}$ permute les sous-ensembles $\{1, 2 \dots d\}$, $\{d+1, d+2 \dots 2d\}$, $\dots \{(r-1)d+1, (r-1)d+2 \dots n\}$ en laissant l'ordre inchangé à l'intérieur de chacun de ces sous-ensembles.

Posons $w(1) = l$. Supposons que l se trouve dans la s -ième section de L_2 . Alors l est le premier élément de cette section parce que, si l' est un élément de cette même section de L_2 qui précède l , on doit avoir $w^{-1}(l') < w^{-1}(l)$ (voir définition de $W(L_1; L_2)$) ce qui est impossible car $w^{-1}(l) = 1$. Donc, $w(1)$ est un entier du type $\alpha d + 1$, $\alpha \in \{0, 1 \dots r\}$ car il est le premier d'une section de L_2 et les cardinaux des sections de L_2 sont tous divisibles par d puisque L_2 se transfère.

Montrons qu'on a $w(2) = \alpha d + 2$, $w(3) = \alpha d + 3 \dots w(d) = (\alpha + 1)d$. Montrons d'abord que les entiers $w(1), w(2) \dots w(d)$ se trouvent tous dans la même section de L_2 . Soit σ la transposition $(1; i)$ pour un $i \in \{2, 3 \dots d\}$. On note toujours σ la matrice de permutation qui lui correspond. La matrice σ se trouve dans le plus petit sous-groupe de Levi standard de G qui se transfère (celui formé de matrices diagonales par blocs de taille d et qui est contenu par conséquence dans tout sous-groupe de Levi standard de G qui se transfère). Donc $\sigma \in L_1 \cap L_2^w$ puisque ce dernier est un sous-groupe de Levi standard qui se transfère. C'est à dire que $\sigma \in L_2^w$ soit $w\sigma w^{-1} \in L_2$. Cela implique que la permutation $w\sigma w^{-1}$ vérifie : pour tout $x \in \{1, 2 \dots n\}$, $w\sigma w^{-1}(x)$ et x se trouvent dans la même section de L_2 . En appliquant cela à $x = w(1)$ on trouve que $w(i)$ et $w(1)$ se trouvent dans la même section de L_2 . C'est ce qu'on voulait démontrer.

Maintenant prouvons que $w(2) = \alpha d + 2$, $w(3) = \alpha d + 3 \dots$ et $w(d) = (\alpha + 1)d$. Si, par exemple, $w(2) \neq \alpha d + 2$, alors on a $w(1) = \alpha d + 1 < \alpha d + 2 < w(2)$. Ces trois entiers étant dans la même section de L_2 (puisque $w(1)$ et $w(2)$ le sont), on a $w^{-1}(w(1)) < w^{-1}(\alpha d + 2) < w^{-1}(w(2))$ (voir encore une fois la définition de $W(L_1; L_2)$) ce qui est impossible car il n'y a aucun entier entre 1 et 2. Ainsi de suite pour $w(3)$ et les autres. On prouve ainsi que w envoie $\{1, 2 \dots d\}$ sur $\{\alpha d + 1, \alpha d + 2 \dots (\alpha + 1)d\}$ sans changer l'ordre.

On continue de la façon suivante : on prouve que $w(d+1)$ est un entier du type $\beta d + 1$. En effet, s'il n'est pas le premier dans la section de L_2 qui le contient, les seuls entiers qui puissent le précéder dans cette section sont $w(1), w(2) \dots$ et $w(d)$. Mais ces entiers sont consécutifs donc si un le précède, tous le précèdent et on a alors $w(d+1) = w(d) + 1 = (\alpha + 1)d + 1$. Après cette remarque la démonstration se déroule comme pour $\{1, 2 \dots d\}$, jusqu'au résultat final.

On a trouvé donc que t réalise une bijection :

$$t : W(L'_1; L'_2) \simeq W(L_1; L_2)_d.$$

Si L_2 a k sections, notons $\mathbf{JLH}^{\otimes k}$ l'isomorphisme d'anneaux

$$\otimes^k \mathcal{R}(D) \simeq \otimes^k [\mathcal{R}(F)/\mathbf{I}_{F,D}]$$

induit par l'isomorphisme d'anneaux

$$\mathbf{JLH} : \mathcal{R}(D) \simeq \mathcal{R}(F)/\mathbf{I}_{F,D}.$$

Alors l'image de $\mathbf{r}_{L_2}^G(\pi)$ dans $\otimes^k[\mathcal{R}(F)/\mathbf{I}_{F,D}]$ est égale à $\mathbf{JLH}^{\otimes k}(r_{L_2'}^{G'}(\pi'))$. Cela se voit en comparant les formules (*) et (**): pour tout $w \in W(L_1'; L_2')$,

$$\mathbf{i}_{w L_1' \cap L_2'}^w(\mathbf{r}_{L_1' \cap L_2'}^w \sigma) \text{ et } \mathbf{i}_{t(w) L_1 \cap L_2}^{t(w)}(\mathbf{r}_{L_1 \cap L_2}^{t(w)} \sigma')$$

se correspondent par $\mathbf{JLH}^{\otimes k}$ et t est une bijection de $W(L_1'; L_2')$ sur $W(L_1; L_2)_d$. Maintenant revenons aux définitions de la comultiplication et de l'involution. Notons $\mathcal{L}$ l'ensemble de sous-groupes de Levi standard de G et $\mathcal{L}_{max}$ son sous-ensemble formé de sous-groupes de Levi standard maximaux. De même, notons $\mathcal{L}'$ l'ensemble de sous-groupes de Levi standard de G' et $\mathcal{L}'_{max}$ son sous-ensemble formé de sous-groupes de Levi standard maximaux. Supposons qu'on est dans la situation L_1 se transfère en L_1' , $\pi = \mathbf{i}_{L_1}^G \sigma$ où σ est une r.e.c.i. de L_1 , σ' est la r.e.c.i. de L_1' qui lui correspond et $\pi' = \mathbf{i}_{L_1'}^{G'} \sigma'$.

On a

$$c(\pi) = \sum_{L \in \mathcal{L}_{max}} \mathbf{r}_L^G(\pi) \in \mathcal{R}(F) \otimes \mathcal{R}(F).$$

Cette somme se décompose en deux sommes : une sur les sous-groupes de Levi standard maximaux de G qui se transfèrent et l'autre sur les sous-groupes de Levi standard maximaux de G qui ne se transfèrent pas. L'image (bien définie, on l'a vu) de $c(\pi)$ dans $\mathcal{R}(F)/\mathbf{I}_{F,D} \otimes \mathcal{R}(F)/\mathbf{I}_{F,D}$ est la même que l'image de la somme sur les sous-groupes de Levi standard maximaux de G qui se transfèrent par la remarque (***) plus haut. D'autre part on a

$$c'(\pi') = \sum_{L' \in \mathcal{L}'_{max}} \mathbf{r}_{L'}^{G'}(\pi') \in \mathcal{R}(D) \otimes \mathcal{R}(D).$$

Les sous-groupes de Levi standard maximaux de G qui se transfèrent se correspondent biunivoquement avec les sous-groupes de Levi standard maximaux de G' . Si L est un tel sous-groupe de G et L' est le sous-groupe de G' qui lui correspond, alors on a vu que l'image de $\mathbf{r}_L^G \pi$ dans $\mathcal{R}(F)/\mathbf{I}_{F,D} \otimes \mathcal{R}(F)/\mathbf{I}_{F,D}$ est égale à $\mathbf{JLH}^{\otimes 2}(\mathbf{r}_{L'}^{G'} \pi')$. Donc, finalement, l'image $\bar{c}(\pi)$ de $c(\pi)$ dans $\mathcal{R}(F)/\mathbf{I}_{F,D} \otimes \mathcal{R}(F)/\mathbf{I}_{F,D}$ est égale à $\mathbf{JLH}^{\otimes 2}(c(\pi'))$. $\square$

3.3. Une précision. Pour un résultat plus précis (prop. 3.11), il nous faut rappeler les travaux de [Ta]. Soit $G' = GL_r(D)$ une forme intérieure de G . Si ρ' est une représentation cuspidale de G' , alors il existe une représentation ρ essentiellement de carré intégrable de G qui correspond à ρ' par Jacquet-Langlands. Cette représentation ρ se trouve au-dessus d'un segment de Zelevinski de longueur k . On pose alors $s(\rho') = k$. Notons ν la norme réduite sur G' . Si ρ' est une représentation cuspidale de G' on pose $\nu_{\rho'} = \nu^{s(\rho')}$. Si σ' est une représentation essentiellement de carré intégrable de G' , alors il existe une représentation cuspidale ρ' de $GL_t(D)$, où t divise r , telle que σ' soit l'unique quotient de l'induite à G' de la représentation $\rho' \otimes \nu_{\rho'} \rho' \otimes \nu_{\rho'}^2 \rho' \dots \otimes \nu_{\rho'}^{(\frac{r}{t}-1)} \rho'$ vue comme représentation du groupe formé des matrices par blocs diagonaux de taille t . On note alors σ' à la Zelevinski, $< [\rho', \nu_{\rho'}^{(\frac{r}{t}-1)} \rho'] >^t$. On appelle la représentation $\rho' \otimes \nu_{\rho'} \rho' \otimes \nu_{\rho'}^2 \rho' \dots \otimes \nu_{\rho'}^{(\frac{r}{t}-1)} \rho'$ segment de Tadić (de Zelevinski quand c'est GL_n lui-même)

et nous l'assimilons à l'ensemble $\{\rho', \nu_{\rho'}\rho', \nu_{\rho'}^2\rho' \dots \nu_{\rho'}^{(\frac{r}{i}-1)}\rho'\}$ quand il s'agit de faire des réunions et intersections de segments. Posons par convention que l'ensemble vide est aussi un segment. On dit que deux segments Δ_1 et Δ_2 de Tadič sont *liés* si leur réunion en tant qu'ensembles est un segment différent à la fois de Δ_1 et Δ_2 . On note ce segment $\Delta_1 \cup \Delta_2$. L'intersection est toujours un segment qu'on note $\Delta_1 \cap \Delta_2$.

Soient L' un sous-groupe de Levi standard de G' qu'on identifie à un produit $GL_{n_1}(D) \times GL_{n_2}(D) \times \dots \times GL_{n_k}(D)$, et $\sigma' = \sigma'_1 \otimes \sigma'_2 \otimes \dots \otimes \sigma'_k$ une r.e.c.i. de L' .

Pour chaque i , soit Δ_i le segment correspondant à σ'_i . Si parmi les Δ_i il y en a deux qui sont liés, Δ_{i_1} et Δ_{i_2} , disons que nous faisons une *opération élémentaire* sur l'ensemble des Δ_i si on remplace les deux segments Δ_{i_1} et Δ_{i_2} par les deux autres segments $\Delta_{i_1} \cap \Delta_{i_2}$ et $\Delta_{i_1} \cup \Delta_{i_2}$. Au nouvel ensemble de segments ainsi obtenu correspond une r.e.c.i. τ' d'un sous-groupe de Levi standard de G' (modulo permutation des blocs plus précisément). Nous disons alors que τ' a été obtenue de σ' par une opération élémentaire. Si τ' et σ' sont des r.e.c.i. de sous-groupes de Levi standard de G' , on dit que τ' est inférieure à σ' si elle peut s'obtenir de σ' par un nombre fini d'opérations élémentaires. Ceci induit un ordre partiel sur l'ensemble des r.e.c.i. des sous-groupes de Levi standard modulo conjugaison. Du coup, nous avons une relation d'ordre évidente associée sur $\mathcal{B}_{G'}$.

Aussi, pour toute r.e.c.i. σ' de G' il existe un unique nombre réel $e(\sigma')$ tel que la représentation $\nu^{e(\sigma')}\sigma'$ soit unitaire. Soit $\sigma' = \sigma'_1 \otimes \sigma'_2 \otimes \dots \otimes \sigma'_k$ tel que $e(\sigma'_i) \geq e(\sigma'_{i+1})$ pour tout $1 \leq i \leq k-1$. Alors l'induite de σ' à G' a un unique quotient irréductible. On le note $Lg(\sigma')$. La notation se justifie par le fait que, regroupant les σ'_i par des paquets maximaux qui ont le même coefficient $e(\)$, on peut induire σ' à un sous-groupe parabolique tel que l'induite soit irréductible et essentiellement tempérée, et $Lg(\sigma')$ soit le quotient de Langlands de cette représentation. Pour toute représentation lisse irréductible π' de G' il existe un σ' comme plus haut tel que π' soit $Lg(\sigma')$. La représentation σ' est unique modulo l'opération qui consiste à permuter entre eux des σ'_i qui ont le même coefficient e . On voit que l'application

$$Q : \mathcal{B}_{G'} \rightarrow Irr(G')$$

donnée par $\mathbf{i}_{L'}^{G'}(\sigma') \mapsto Lg(\sigma')$ est bien définie et bijective. La relation d'ordre sur $\mathcal{B}_{G'}$ induit ainsi une relation d'ordre sur $Irr(G')$. On étudie plus en détail la relation entre ces deux bases remarquables de $Grot(G')$ que sont $\mathcal{B}_{G'}$ et $Irr(G')$.

On utilise le résultat fondamental suivant ([Ta], généralisant [Ze]) :

Proposition 3.8. *Soit σ' une r.e.c.i. d'un sous-groupe de Levi standard de G' . Dans l'écriture de l'image dans $Grot(G')$ de l'induite de σ' à G' comme somme de classes de représentations irréductibles,*

- *$Lg(\sigma')$ apparaît avec multiplicité exactement 1*
- *une représentation irréductible π' apparaît avec une multiplicité non nulle si et seulement si $\pi' \leq \sigma'$.*

Si L' est un sous-groupe de Levi standard de G' et ρ' est une représentation cuspidale de L' , notons $Grot(G')_{(L', \rho')}$ le sous-groupe de $Grot(G')$ engendré par les images des représentations irréductibles qui sont des sous-quotients de $\mathbf{i}_{L'}^{G'}(\rho')$. Soit X l'ensemble de classes modulo permutation par blocs de couples (L', ρ') . Il est clair que, si $x, y \in X$ et $x \neq y$ alors $Grot(G')_x$ et $Grot(G')_y$ sont disjoints et que $Grot(G')$ est la somme directe

des $Grot(G')_x$ sur tous les $x \in X$. Pour tout $x \in X$, $Grot(G')_x$ est un $\mathbb{Z}$ -module de dimension finie. Il admet deux bases naturelles : $\mathcal{B}_{G'} \cap Grot(G')_x$ et $Irr(G') \cap Grot(G')_x$. Ordonnons la base $\mathcal{B}_{G'} \cap Grot(G')_x$ dans un ordre croissant pour la relation définie plus haut (i.e. chaque fois qu'un élément est inférieur à un autre, il le précède). Ordonnons la base $Irr(G') \cap Grot(G')_x$ dans l'ordre (croissant) correspondant via l'application Q . La matrice de passage entre les deux bases est de taille finie, et la proposition 3.8 implique qu'elle est triangulaire supérieure unipotente. C'est donc pareil pour la matrice de passage dans l'autre sens, ce qui prouve le résultat suivant, dual en quelque sorte du précédent :

Proposition 3.9. *Soit $\pi' = Lg(\sigma')$ (σ' r.e.c.i. d'un sous-groupe de Levi standard L') une représentation lisse irréductible de G' . Dans $Grot(G')$ on a*

$$\pi' = \mathbf{i}_{L'}^{G'}(\sigma') + \sum_{\sigma'_i < \sigma'} a_i \mathbf{i}_{L'_i}^{G'}(\sigma'_i)$$

où les a_i sont des entiers et, pour tout i , L'_i est un sous-groupe de Levi standard et σ'_i est une r.e.c.i. de L'_i .

Remarquons au passage que, si x et y appartenant à X sont distincts, alors aucun élément de la base $\mathcal{B}_{G'} \cap Grot(G')_x$ n'est en relation d'ordre avec un élément de la base $\mathcal{B}_{G'} \cap Grot(G')_y$. C'est une conséquence du fait qu'en faisant une opération élémentaire on reste "au-dessus" d'une même classe cuspidale (L', ρ') .

Lemme 3.10. *L'application $\mathbf{JL}_r$ de $\mathcal{B}_{G'}$ dans $\mathcal{B}_G$ est croissante.*

Démonstration. L'ensemble des segments de Tadič de G' est en bijection avec l'ensemble des r.e.c.i. de G' , et l'ensemble des segments de Zelevinski de G est en bijection avec l'ensemble des r.e.c.i. de G . À travers la correspondance de Jacquet-Langlands il existe donc une bijection naturelle de l'ensemble des segments de Tadič de G' dans l'ensemble de segments de Zelevinski de G (attention, elle ne coïncide pas avec la restriction de l'application $\mathbf{JLH} : \mathcal{R}(D) \rightarrow \mathcal{R}(F)$).

Il est facile à voir qu'à des segments de Tadič Δ_1 et Δ_2 liés sur G' correspondent par cette bijection des segments de Zelevinski Γ_1 et Γ_2 liés sur G (la réciproque étant fausse). Aussi, à $\Delta_1 \cap \Delta_2$ correspond $\Gamma_1 \cap \Gamma_2$ et à $\Delta_1 \cup \Delta_2$ correspond $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$. Ceci montre que notre injection de $\mathcal{B}_{G'}$ dans $\mathcal{B}_G$ préserve l'ordre défini plus haut. $\square$

On pourrait penser que, si $a, b \in \mathcal{B}_{G'}$, si $\mathbf{JL}_r(b) < \mathbf{JL}_r(a)$, alors $b < a$. Ceci n'est pas vrai, comme le montre le contre-exemple suivant qui m'a été fourni par Andrei Moroianu:

Fait (troublant). Considérons les représentations

$$\sigma_1 = \text{ind}(< [\rho; \nu^5 \rho] >^t \otimes < [\nu \rho; \nu^8 \rho] >^t \otimes < [\nu^3 \rho; \nu^6 \rho] >^t \otimes < [\nu^4 \rho; \nu^9 \rho] >^t)$$

et

$$\sigma_2 = \text{ind}(< [\rho; \nu^9 \rho] >^t \otimes < [\nu \rho; \nu^6 \rho] >^t \otimes < [\nu^3 \rho; \nu^8 \rho] >^t \otimes < [\nu^4 \rho; \nu^5 \rho] >^t)$$

de $G = GL_{24}(F)$, où ρ est un caractère de F^* . σ_1 et σ_2 sont des éléments de $\mathcal{B}_G$ et on a $\sigma_2 < \sigma_1$. Soit D une algèbre de quaternions sur F . Soit ρ' la représentation de

D^* qui correspond à $< [\rho; \nu\rho] >^t$ par Jacquet-Langlands. On a $\nu_{\rho'} = \nu^2$. On considère maintenant les représentations

$$a = \text{ind}(< [\rho'; \nu_{\rho'}^2 \rho'] >^t \otimes < [\nu\rho'; \nu_{\rho'}^3 \nu\rho'] >^t \otimes < [\nu^3 \rho'; \nu_{\rho'} \nu^3 \rho'] >^t \otimes < [\nu^4 \rho'; \nu_{\rho'}^2 \nu^4 \rho'] >^t)$$

et

$$b = \text{ind}(< [\rho'; \nu_{\rho'}^4 \rho'] >^t \otimes < [\nu\rho'; \nu_{\rho'}^2 \nu\rho'] >^t \otimes < [\nu^3 \rho'; \nu_{\rho'}^2 \nu^3 \rho'] >^t \otimes < [\nu^4 \rho'; \nu^4 \rho'] >^t)$$

de $G' = GL_{12}(D)$. Alors $a, b \in \mathcal{B}_{G'}$, $\mathbf{JL}_r(a) = \sigma_1$, $\mathbf{JL}_r(b) = \sigma_2$, mais il est clair qu'on n'a pas $b < a$, (seuls les segments $[\rho'; \nu_{\rho'}^2 \rho']$ et $[\nu^4 \rho'; \nu_{\rho'}^2 \nu^4 \rho']$ dans la formule de a sont liés).

Donnons maintenant le résultat qui précise un peu plus la correspondance $\mathbf{JL}_r$:

Proposition 3.11. *Soit π' une représentation lisse irréductible de G' . Posons $\pi' = \text{Lg}(\sigma')$, où σ' est une r.e.c.i. d'un sous-groupe de Levi standard L' de G' . Soient L le sous-groupe de Levi standard de G qui correspond à L' , et $\sigma = \mathbf{C}^{-1}(\sigma')$ la r.e.c.i. de L qui correspond à σ' . Posons $\pi = \text{Lg}(\sigma)$. Alors on a*

$$\mathbf{JL}_r(\pi') = \pi + \sum_{\sigma_i < \sigma} a_i \mathbf{i}_{L_i}^G(\sigma_i) = \pi + \sum_{\pi_j < \pi} b_j \pi_j$$

où les a_i et les b_j sont des entiers et, pour tout i , L_i est un sous-groupe de Levi standard de G , σ_i sont des r.e.c.i. de L_i . et π_j sont des représentations lisses irréductibles de G .

Démonstration. Écrivons

$$\pi' = \mathbf{i}_{L'}^{G'}(\sigma') + \sum_{\sigma'_i < \sigma'} a_i \mathbf{i}_{L'_i}^{G'}(\sigma'_i)$$

comme dans la prop. 3.9. La définition de $\mathbf{JL}_r$ donne :

$$(3.2) \quad \mathbf{JL}_r(\pi') = \mathbf{i}_L^G(\sigma) + \sum_{\sigma_i} a_i \mathbf{i}_{L_i}^G(\sigma_i)$$

où L_i correspond à L'_i et σ_i correspond à σ'_i . On a $\sigma_i < \sigma$ par le lemme 3.10.

Appliquons la prop. 3.9 à π :

$$\pi = \mathbf{i}_L^G(\sigma) + \sum_{\sigma_j < \sigma} a'_j \mathbf{i}_{M_j}^G(\sigma_j)$$

et substituons $\mathbf{i}_L^G(\sigma)$ dans l'équation 3.2. On obtient

$$\mathbf{JL}_r(\pi') = \pi - [\sum_{\sigma_j < \sigma} a'_j \mathbf{i}_{M_j}^G(\sigma_j)] + \sum_{\sigma_i < \sigma} a_i \mathbf{i}_{L_i}^G(\sigma_i).$$

Cela prouve la première égalité. La deuxième est évidente. $\square$

3.4. Une conjecture. À ce stade, on peut se poser la question, si π' et π sont comme plus haut, si on a la relation entre caractères

$$\chi_\pi(g) = (-1)^{n-r} \chi_{\pi'}(g')$$

pour tout g et g' qui se correspondent. Nous ne pourrions pas démontrer que $\mathbf{JL}_r(\pi') = \pi$, puisqu'on sait que $\mathbf{JL}_r$ n'envoie pas toute représentation irréductible sur une représentation irréductible, mais il se peut que π' et π se correspondent toutefois. Dans le contre-exemple du deuxième commentaire à la section 3.1 nous définissons π' irréductible telle que $\mathbf{JL}_r(\pi')$ ne soit pas une représentation irréductible, mais, dans ce cas par exemple, π' correspond à π quand-même ! (voir prop. 3.13 plus bas).

3.4.1. La conjecture. Ceci nous motive à poser une conjecture. On va dire que $\pi \in \text{Grot}(G)$ et $\pi' \in \text{Grot}(G')$ se correspondent si on a la relation entre les caractères

$$(3.3) \quad \chi_\pi(g) = (-1)^{n-r} \chi_{\pi'}(g')$$

pour tous $g \in G$ et $g' \in G'$ qui se correspondent.

Conjecture. Soit $\pi' = Lg(\sigma')$ une représentation lisse irréductible de G' . Alors π' correspond à $\pi = Lg(\sigma)$, où $\sigma = \mathbf{C}^{-1}(\sigma')$.

Nous ne savons pas prouver cette conjecture en général.

3.4.2. Possible application. Tout d'abord, que la conjecture soit vraie ou pas, on pose $M(\pi') = \pi$. Il est évident que $\pi' \mapsto M(\pi')$ induit par linéarité un morphisme injectif de groupes $M : \text{Grot}(G') \rightarrow \text{Grot}(G)$, qui respecte l'irréductibilité (M n'est autre que $Q^{-1}\mathbf{JL}_rQ$). Nous noterons abusivement par la suite avec la même lettre M ce morphisme pour tous les entiers r confondus.

Proposition 3.12. Supposons que la conjecture soit vraie. Soient $\pi'_1 \in \text{Irr}(GL_{r_1}(D))$ et $\pi'_2 \in \text{Irr}(GL_{r_2}(D))$. Si l'induite à $GL_{d(r_1+r_2)}(F)$ de $M(\pi'_1) \otimes M(\pi'_2)$ est irréductible, alors l'induite à $GL_{(r_1+r_2)}(D)$ de $\pi'_1 \otimes \pi'_2$ est irréductible (se généralise immédiatement à plusieurs représentations).

Démonstration. Posons $\pi'_1 = Lg(\sigma'_1)$, $\pi'_2 = Lg(\sigma'_2)$, $\pi_1 = Lg(\sigma_1)$ et $\pi_2 = Lg(\sigma_2)$ (σ_i et σ'_i se correspondent). Si l'induite à $GL_{d(r_1+r_2)}(F)$ de $M(\pi'_1) \otimes M(\pi'_2)$ est irréductible, elle est égale à $Lg(\sigma_1 \otimes \sigma_2)$ ([Ta]). Donc $Lg(\sigma_1 \otimes \sigma_2)$ correspond à la fois à l'induite de $\pi'_1 \otimes \pi'_2$ et à $Lg(\sigma'_1 \otimes \sigma'_2)$ (par la conjecture supposée vraie). Ces deux représentations de $GL_{(r_1+r_2)}(D)$ ont donc des caractères égaux, elles sont donc dans la même classe. $\square$

3.4.3. Cas (très) particuliers.

Proposition 3.13. Soient σ'_1 et σ'_2 deux représentations r.e.c.i. de $GL_{r_1}(D)$ et $GL_{r_2}(D)$ respectivement, $r_1 + r_2 = r$. Alors tout sous-quotient irréductible de l'induite à G' de $\sigma'_1 \otimes \sigma'_2$ vérifie la conjecture.

Démonstration. Soient $\sigma_1 = \mathbf{JL}_r(\sigma'_1)$ et $\sigma_2 = \mathbf{JL}_r(\sigma'_2)$. On a

$$\mathbf{JL}_r(\text{ind } \sigma'_1 \otimes \sigma'_2) = \text{ind } \sigma_1 \otimes \sigma_2$$

donc ces deux représentations se correspondent.

Si les segments associés à σ_1 et σ_2 ne sont pas liés alors les segments associés à σ'_1 et σ'_2 ne sont pas liés non plus, les deux induites sont irréductibles et la proposition est démontrée.

Si les segments associés à σ_1 et σ_2 sont liés, alors

$$\text{ind } \sigma_1 \otimes \sigma_2 = Lg(\sigma_1 \otimes \sigma_2) + \text{ind } \tau$$

où τ est la seule r.e.c.i. inférieure à $\sigma_1 \otimes \sigma_2$. Par ailleurs τ est minimale et donc son induite est irréductible. On a donc

$$\text{ind } \sigma_1 \otimes \sigma_2 = Lg(\sigma_1 \otimes \sigma_2) + Lg(\tau)$$

Maintenant on a deux possibilités :

- ou bien les segments associés à σ'_1 et σ'_2 sont liés, ce qui arrive si et seulement si le sous-groupe de définition de τ se transfère, et alors

$$\text{ind } \sigma'_1 \otimes \sigma'_2 = Lg(\sigma'_1 \otimes \sigma'_2) + \text{ind } \tau'.$$

La r.e.c.i. τ' est minimale et on écrit

$$\text{ind } \sigma'_1 \otimes \sigma'_2 = Lg(\sigma'_1 \otimes \sigma'_2) + Lg(\tau').$$

On a $\tau = \mathbf{JL}_r(\tau')$ donc leurs induites se correspondent, ce qui montre que $Lg(\tau')$ correspond à $Lg(\tau)$. Donc aussi, nécessairement, $Lg(\sigma'_1 \otimes \sigma'_2)$ et $Lg(\sigma_1 \otimes \sigma_2)$ se correspondent.

- ou bien les segments associés à σ'_1 et σ'_2 ne sont pas liés, i.e.

$$\text{ind } \sigma'_1 \otimes \sigma'_2 = Lg(\sigma'_1 \otimes \sigma'_2)$$

est irréductible. Mais, si les segments associés à σ'_1 et σ'_2 ne sont pas liés cela veut dire que le groupe de définition de τ ne se transfère pas, donc l'induite à G de τ est G' -nulle. Donc $Lg(\sigma'_1 \otimes \sigma'_2)$ correspond à $Lg(\sigma_1 \otimes \sigma_2)$. $\square$

Corollaire 3.14. *Si $r = 2$ la conjecture est vérifiée.*

Démonstration. Une représentation de $GL_2(D)$ est ou bien cuspidale, ou bien un sous-quotient comme dans la proposition. $\square$

Proposition 3.15. *Soit $S' = \{\rho', \nu_{\rho'} \rho' \dots \nu_{\rho'}^k \rho'\}$ un segment de G' . Alors tout sous-quotient irréductible de l'induite de S à G' vérifie la conjecture.*

Démonstration. Soit π' un tel sous-quotient. Notons L' le sous-groupe de Levi du segment S' , L le sous-groupe de Levi de G' qui lui correspond, et S la r.e.c.i. de L qui correspond à ρ' . Il arrive que, dans ce cas particulier, toutes les r.e.c.i. inférieures à S (du côté G) sont définies sur des sous-groupes de Levi qui se transfèrent, et correspondent donc biunivoquement aux r.e.c.i. inférieures à S' . De plus, on sait que, dans l'induite d'une telle r.e.c.i. tous les sous-quotients apparaissent avec multiplicité exactement 1. On peut donc faire une démonstration par récurrence sur le nombre de représentations de G' inférieures à π' .

Si π' est minimale, elle est une r.e.c.i. et le résultat découle de la prop. 3.13.

Supposons que, pour tout $\tau' < \pi'$, τ' correspond à $M(\tau')$. Si $\pi' = Lg(\sigma')$ et σ' correspond à σ , alors les induites de σ et σ' se correspondent. On en déduit que $\pi' + \sum_{\tau' < \pi'} \tau'$ correspond à $M(\pi') + \sum_{\tau' < \pi'} M(\tau')$. D'où le résultat en appliquant l'hypothèse de récurrence. $\square$

Un cas intéressant sont les représentations génériques de G . On attend d'une représentation automorphe cuspidale de GL_n que toutes ses composantes locales soient tempérées aux places non archimédiennes, mais pour l'instant nous savons du moins qu'elles sont toujours génériques ([Sh], pp. 190). Par [Ze], nous savons aussi qu'une représentation générique π de G est toujours de la forme $ind_P^G(\sigma)$, où P est un sous-groupe parabolique standard de G et σ est une r.e.c.i. du sous-groupe de Levi standard de P telle que l'induite soit irréductible. Nous avons la

Proposition 3.16. *Si P ne se transfère pas, alors le caractère de π est G' -nul. Si P se transfère, alors π vérifie la conjecture.*

Démonstration. La première assertion est évidente, car π se trouve dans $\mathbf{S}_{G,G'}$ par définition même. La deuxième affirmation n'est pas difficile : si P' est le sous-groupe parabolique standard de G' qui correspond à P , et σ' est la r.e.c.i. du sous-groupe de Levi standard de P' qui correspond à σ par Jacquet-Langlands, alors les critères des réductibilité de [Ze] et [Ta] pour les induites des r.e.c.i. impliquent que, $ind_P^G(\sigma)$ étant irréductible, $ind_{P'}^{G'}(\sigma')$ l'est aussi. D'où le résultat. $\square$

Le transfert des composantes locales des représentations automorphes cuspidales de GL_n est donc simple. Le problème des *certaines* composantes locales des représentations du spectre résiduel est étudié dans la sous-section suivante.

3.5. L'involution. A. Zelevinski a défini une involution de l'algèbre de Hopf $\mathcal{R}(F)$ (prop. 9.12, [Ze]). Dans [Au], A.-M. Aubert définit une involution du groupe de Grothendieck d'un groupe réductif quelconque. Elle montre également que cette involution envoie une représentation irréductible sur une représentation irréductible au signe près et que cette involution coïncide au signe près avec celle de Zelevinski dans le cas du groupe linéaire. Posons $G = GL_n(F)$. Sur $Grot(G)$, l'involution de [Au] est définie de la façon suivante : si $\mathcal{L}$ est l'ensemble de sous-groupes de Levi standard de G , si π est un élément de $Grot(G)$, alors

$$i(\pi) = \sum_{L \in \mathcal{L}} (-1)^{|L|} \mathbf{i}_L^G \mathbf{r}_L^G(\pi).$$

Cette involution ne s'étend pas bien à $\mathcal{R}(F)$ comme celle de Zelevinski, à cause d'un signe qui entrave la linéarité ([Au], th. 2.3). Nous allons étudier le comportement de i par rapport au morphisme $\overline{\mathbf{JL}}_r$ défini au th. 3.2, c).

Notons i' involution de A.-M. Aubert pour $G' = GL_r(D)$ (formule analogue à celle pour G).

Théorème 3.17. *L'involution i de $Grot(G)$ induit une involution bien définie $\bar{i}$ de $Grot(G)/\mathbf{S}_{G,G'}$. L'isomorphisme $\overline{\mathbf{JL}}_r$ transforme l'involution i' en l'involution $(-1)^{n-r} \bar{i}$.*

Démonstration. Soit $\pi \in \mathbf{S}_{G,G'}$. On veut montrer que $i(\pi) \in \mathbf{S}_{G,G'}$. Or, on a vu que $\mathbf{I}_{F,D}$ est stable par induction et par restriction. Il suffit donc d'utiliser la formule

$$i(\pi) = \sum_{L \in \mathcal{L}} (-1)^{|L|} \mathbf{i}_L^G \mathbf{r}_L^G(\pi),$$

car $\mathbf{S}_{G,G'} = \text{Grot}(G) \cap \mathbf{I}_{F,D}$.

Ainsi, l'involution i "passe au quotient", et $\bar{i}$ est bien définie (involution, évidemment).

On montre que $\overline{\mathbf{JL}_r}(i') = (-1)^{n-r} \bar{i}$. Si $\pi \in \text{Grot}(G')$, on veut prouver que

$$(-1)^{n-r} i(\mathbf{JL}_r(\pi)) = \mathbf{JL}_r(i'(\pi)).$$

On utilise encore **JLH**. En effet, il suffit de montrer que

$$(-1)^{n-r} i(\mathbf{JLH}(\pi)) = \mathbf{JLH}(i'(\pi)).$$

On a

$$i'(\pi') = \sum_{L' \in \mathcal{L}'} (-1)^{|L'|} \mathbf{i}_{L'}^{G'} \mathbf{r}_{L'}^{G'}(\pi').$$

Aussi,

$$i(\mathbf{JL}(\pi')) = \sum_{L \in \mathcal{L}} (-1)^{|L|} \mathbf{i}_L^G \mathbf{r}_L^G(\mathbf{JL}(\pi')) = S_1 + S_2$$

où S_1 est la somme sur les sous-groupes de Levi standard de G qui se transfèrent et S_2 sur les sous-groupes de Levi standard de G qui ne se transfèrent pas. La deuxième de ces sommes est nulle modulo $\mathbf{S}_{G,G'}$.

Les sous-groupes de Levi standard de G qui se transfèrent correspondent biunivoquement aux sous-groupes de Levi standard de G' . Par ailleurs, si L et L' se correspondent on a $(-1)^{|L|} = (-1)^{n-r} (-1)^{|L'|}$. On a aussi, si L et L' se correspondent,

$$\mathbf{JLH}(\mathbf{i}_{L'}^{G'} \mathbf{r}_{L'}^{G'}(\pi')) = \overline{\mathbf{i}_L^G \mathbf{r}_L^G(\mathbf{JL}(\pi'))}$$

car **JLH** est un isomorphisme d'algèbres de Hopf (th. 3.6.c)). Le résultat s'ensuit. $\square$

Nous en déduisons alors la

Proposition 3.18. *Si deux r.e.c.i. se correspondent par la correspondance de Jacquet-Langlands, leurs duales se correspondent au signe près.*

Ce n'est pas, en général, un cas particulier de la conjecture. C'est néanmoins ce qui importe pour les correspondances globales établies à la section suivante.

4. QUELQUES RÉSULTATS GLOBAUX ET LEUR CONSÉQUENCES LOCALES

4.1. Un lemme. Soit F un corps local non-archimédien. Soit G' une forme intérieure de GL_n sur F . On dit qu'une représentation lisse irréductible de G' est *elliptique* si son caractère n'est pas identiquement nul sur l'ensemble des éléments elliptiques réguliers. Le lemme suivant affirme que G' vérifie l'hypothèse locale du cor. 7.3 de [Ar].

Lemme 4.1. *Soient P un sous-groupe parabolique propre de G' , L un sous-groupe de Levi de P et π une représentation unitaire de L . Alors l'induite parabolique $\text{ind}_P^{G'} \pi$ n'a aucun sous-quotient elliptique.*

Démonstration. Soit σ une représentation lisse irréductible elliptique de G' . σ peut s'écrire dans le groupe de Grothendieck de G' comme une somme de représentations obtenues par induction parabolique à partir de représentations r.e.c.i. ([Ta], prop. 2.1). Ces représentations ont le même support cuspidal que σ . Comme σ est elliptique, ces représentations ne peuvent pas être toutes induites à partir de sous-groupes paraboliques propres. Il y a donc parmi elles au moins une (en fait exactement une, mais peu importe) r.e.c.i. de G' . Donc, le support cuspidal de σ est forcément un segment de Tadič.

Maintenant, si l'induite de π est irréductible, elle ne peut pas être elliptique (tout en étant son seul sous-quotient) et le lemme est clairement vrai.

Si l'induite de π est réductible, alors tout sous-quotient de $\text{ind}_P^{G'} \pi$ en est une sous-représentation parce que π est unitaire. En appliquant la réciprocité de Frobenius à chaque sous-représentation π_i , on trouve que π est un sous-quotient de $\text{res}_P^{G'} \pi_i$. Ainsi, si $\text{ind}_P^{G'} \pi$ est réductible, parmi les sous-quotients de $\text{res}_P^{G'} \text{ind}_P^{G'} \pi_i$, π apparaît avec une multiplicité strictement supérieure à 1 (*). Si on suppose par l'absurde que l'induite de π contient une représentation elliptique σ , alors le support cuspidal de π , étant le même que celui de σ , doit être un segment de Tadič d'un sous-groupe de Levi L , d'après ce qui précède. Dans la restriction à L de l'induite de π tous les sous-quotients apparaissent donc avec multiplicité 1 (**). Il y a une contradiction entre (*) et (**) qui prouve le lemme. $\square$

4.2. Sur la correspondance de Jacquet-Langlands globale. Soient F un corps global et G' une forme intérieure de $GL_n(F)$. Pour toute place v de F on note F_v le complété de F en v et on pose $G_v = GL_n(F_v)$ et $G'_v = G'(F_v)$. Soient Z le centre de G' et ω un caractère unitaire de $Z(F) \backslash Z(\mathbb{A})$. On note R la représentation régulière (translation à droite) de $G'(\mathbb{A})$ dans $L^2(\omega, G'(F) \backslash G'(\mathbb{A}))$, où $\mathbb{A}$ désigne l'anneau des adèles de F . On appelle *série discrète* toute sous-représentation irréductible de R . On note R_{disc} la sous-représentation de R engendrée par la partie discrète. Si π est une série discrète de G' et v est une place de F , on note π_v la composante locale de π à la place v .

Fixons une place finie v de F . Rappels : soient $g \in G_v$ et $g' \in G'_v$; on dit que g et g' *se correspondent* si leurs polynômes caractéristiques sont égaux, et sans racine multiple sur une clôture algébrique de F_v . Soit $Grot(G_v)$ (resp. $Grot(G'_v)$) le groupe de Grothendieck des représentations lisses de longueur finie de G_v (resp. G'_v). Soient $\pi \in Grot(G_v)$ et $\pi' \in Grot(G'_v)$. On dit que π et π' *se correspondent* si l'on a la relation entre les caractères :

$$(4.1) \quad \chi_\pi(g) = (-1)^{n-r_v} \chi_{\pi'}(g')$$

si g et g' se correspondent.

Nous utilisons l'abréviation *r.c.i.* pour représentation de carré intégrable. À la ssect. 3.5 nous avons étudié l'involution i' définie sur $Grot(G'_v)$ par la formule de dualité de [Au]. À partir de maintenant nous dirons qu'une représentation irréductible π de G'_v est la duale d'une représentation irréductible σ si $i'(\pi)$ est égal à σ ou $-\sigma$. La dualité sur G_v obtenue de façon analogue est la dualité de Zelevinski. Rappelons que la duale d'une représentation cuspidale est elle-même. Nous utilisons l'abréviation *d.r.c.i.* pour *représentation duale d'une représentation de carré intégrable*. Notons $Ca(G_v)$, $Ca(G'_v)$

(resp. $Du(G_v)$, $Du(G'_v)$) l'ensemble des classes de r.c.i. (resp. d.r.c.i.) de G_v et G'_v . Il existe une unique bijection C de $Ca(G_v)$ sur $Ca(G'_v)$ telle que tout $\pi \in Ca(G_v)$ corresponde à $C(\pi)$ (correspondance de Jacquet-Langlands). Il existe aussi une unique bijection D (ne pas confondre avec l'algèbre à division des sections précédentes et qui n'apparaîtra plus) de $Du(G_v)$ sur $Du(G'_v)$ telle que tout $\pi \in Du(G_v)$ corresponde à $(-1)^{n-r} D(\pi)$ (prop. 3.18).

Soient $\pi \in Grot(G_v) \cup Grot(G'_v)$ et $\pi' \in Grot(G'_v)$. On dit que π et π' *se correspondent faiblement* s'il existe $\epsilon \in \{-1, 1\}$ tel que les caractères vérifient :

$$(4.2) \quad \chi_\pi(g) = \epsilon \chi_{\pi'}(g')$$

si $g \in G_v$ et $g' \in G'_v$ sont elliptiques réguliers et se correspondent.

Lemme 4.2. *Si π est une représentation irréductible elliptique de G_v ou de G'_v , alors π correspond faiblement à une r.e.c.i. de G'_v .*

Démonstration. Supposons pour simplifier que π est une représentation de G'_v (sinon on transfère par **LJ** De G_v à G'_v). On sait que π s'écrit comme une combinaison linéaire de représentations induites à partir de r.e.c.i. de sous-groupe de Levi standard de G'_v . Comme elle est elliptique, il y a au moins un sous-groupe de Levi standard qui n'est pas propre. Comme toutes les r.e.c.i. qui apparaissent ont le même support cuspidal, et comme au-dessus d'un support cuspidal donné il existe sur G'_v au plus une r.e.c.i. ([Ta]), on en déduit qu'exactement l'un des sous-groupe de Levi standard n'est pas propre. Comme les autres induites sont nulles sur l'ensemble des éléments elliptiques réguliers, on en déduit que π correspond faiblement à un multiple scalaire d'une r.e.c.i. σ . Le scalaire en question est le coefficient de σ dans la somme des induites de r.e.c.i. qui représente π . Ce coefficient est plus ou moins un, par une formule d'inversion de Möbius classique (voir [Ze], prop 9.13). $\square$

Soit V l'ensemble des places de F où G' est ramifié. On suppose que V ne contient pas des places infinies. Rappelons qu'une représentation π de G_v qu'elle est G'_v -nulle si le caractère de π est nul sur l'ensemble des éléments de G_v qui correspondent aux éléments de G'_v . Fixons deux places distinctes v_1 et v_2 de F . On note A l'ensemble des séries discrètes π de G telles que, pour tout $v \in V$, π_v n'est pas G'_v -nulle et la composante locale de π en v_1 et v_2 est elliptique.

Soit X_π l'ensemble des séries discrètes de G' telles que, pour toute place $v \notin V \cup \{v_1, v_2\}$ on a $\pi_v \cong \pi'_v$.

À partir de maintenant, sauf mention du contraire, le corps global F est de caractéristique nulle.

Proposition 4.3. *X_π n'est pas vide.*

Démonstration. Nous appliquons la démarche classique de [JL], en utilisant la formule des traces simple de [Ar], cor.7.5, avec des fonctions à support dans les éléments elliptiques réguliers aux places v_1 et v_2 . Cette formule s'applique à G et G' grâce au lemme 4.1. On arrive à

$$(4.3) \quad \prod_{v \in V \cup \{v_1, v_2\}} \chi_{\pi_v}(g_v) = \sum_{\pi' \in X_\pi} m(\pi') \prod_{v \in V \cup \{v_1, v_2\}} \chi_{\pi'_v}(g'_v)$$

($m(\pi')$ sont des multiplicités non nulles) si, pour toute place $v \in V \cup \{v_1, v_2\}$, $g_v \in G_v$ et $g'_v \in G'_v$ se correspondent et, de plus, g_{v_1} et g_{v_2} sont elliptiques réguliers. Nous avons aussi utilisé le théorème de multiplicité un pour le spectre discret de G . Comme $\pi \in A$, on peut choisir les g_v de telle façon que g_{v_1} et g_{v_2} soient elliptiques réguliers, que les autres g_v correspondent à des $g'_v \in G'_v$ et que le terme de gauche de la formule soit non nul. Donc le terme de droite n'est pas identiquement nul. Alors X_π n'est pas vide. $\square$

Proposition 4.4. *Soit $\pi \in A$ cuspidale. Alors il existe $\pi' \in X_\pi$ telle que π'_v correspond à π_v pour tout $v \in V \setminus \{v_1, v_2\}$, et π'_v correspond faiblement à π_v pour $v \in \{v_1, v_2\}$.*

Démonstration. On utilise l'égalité 4.3. Par [Ba3], X_π est fini. À toute place $v \in V \setminus \{v_1, v_2\}$ la composante locale de π est générique ([Sh]). Pour $v \in V \setminus \{v_1, v_2\}$ π_v n'est pas G'_v -nulle par hypothèse. On applique la prop. 3.16. Le caractère de chaque π_v , $v \in V \setminus \{v_1, v_2\}$ peut être “remplacé” dans la formule par le caractère de la représentation u'_v de G'_v correspondante :

$$\prod_{v \in V \setminus \{v_1, v_2\}} u'_v(g'_v) \prod_{v \in \{v_1, v_2\}} \chi_{\pi_v}(g_v) = \epsilon \sum_{\pi' \in X_\pi} m(\pi') \prod_{v \in V \setminus \{v_1, v_2\}} \chi_{\pi'_v}(g'_v) \prod_{v \in \{v_1, v_2\}} \chi_{\pi'_v}(g'_v)$$

où ϵ est un signe et, pour $v \in \{v_1, v_2\}$, g'_v correspond à g_v elliptiques réguliers quelconques. Soit X'_π l'ensemble de tous les $\pi' \in X_\pi$ tels que π'_v est équivalent à u'_v pour tout $v \in V \setminus \{v_1, v_2\}$. On peut alors écrire :

$$\begin{aligned} & \prod_{v \in V \setminus \{v_1, v_2\}} u'_v(g'_v) \left(\prod_{v \in \{v_1, v_2\}} \chi_{\pi_v}(g_v) - \epsilon \sum_{\pi' \in X'_\pi} m(\pi') \prod_{v \in \{v_1, v_2\}} \chi_{\pi'_v}(g'_v) \right) = \\ & = \epsilon \sum_{\pi' \in X_\pi \setminus X'_\pi} m(\pi') \prod_{v \in V \setminus \{v_1, v_2\}} \chi_{\pi'_v}(g'_v) \prod_{v \in \{v_1, v_2\}} \chi_{\pi'_v}(g'_v) \end{aligned}$$

pour tout g_v et g'_v , $v \in \{v_1, v_2\}$, qui sont elliptiques réguliers et se correspondent. Par indépendance linéaire des caractères sur

$$\prod_{v \in \{v_1, v_2\}} \chi_{\pi_v}(g_v) - \epsilon \sum_{\pi' \in X'_\pi} m(\pi') \prod_{v \in \{v_1, v_2\}} \chi_{\pi'_v}(g'_v) = 0$$

pour des tels g_v et g'_v .

Comme $\pi \in A$, il existe g_{v_1} et g_{v_2} elliptiques réguliers tels que $\chi_{\pi_{v_1}}(g_{v_1})$ et $\chi_{\pi_{v_2}}(g_{v_2})$ soient non nuls. Donc X'_π est non vide.

Soit X''_π l'ensemble des $\pi' \in X'_\pi$ tels que π'_{v_1} et π'_{v_2} sont elliptiques. Il est clair que la dernière relation peut s'écrire $\prod_{v \in V \setminus \{v_1, v_2\}} G'_v$, on obtient que

$$\prod_{v \in \{v_1, v_2\}} \chi_{\pi_v}(g_v) - \epsilon \sum_{\pi' \in X''_\pi} m(\pi') \prod_{v \in \{v_1, v_2\}} \chi_{\pi'_v}(g'_v) = 0.$$

En utilisant le lemme 4.2 et l'orthogonalité des caractères sur G'_v , $v \in \{v_1, v_2\}$, on en déduit que pour au moins une des $\pi' \in X''_\pi$, π'_v correspond faiblement à π_v , pour $v \in \{v_1, v_2\}$. $\square$

Soit maintenant $\pi \in A$ dans le spectre résiduel. Alors π provient d'un segment $[\rho, k]$ comme dans [MW], où k divise n et ρ est une représentation cuspidale de $GL_{\frac{n}{k}}(F)$. Si ρ_v est cuspidale, alors π_v est une d.r.c.i..

Proposition 4.5. *Supposons que ρ_v est cuspidale pour toute $v \in V$. Alors il existe $\pi' \in X_\pi$ telle que*

- pour toute place $v \in V \setminus \{v_1, v_2\}$ on ait $\pi'_v = D(\pi_v)$ et
- π'_v correspond faiblement à π_v pour $v \in \{v_1, v_2\}$.

Démonstration. La preuve est la même que pour la proposition précédente, en utilisant l'application D à la place de l'application C . $\square$

Proposition 4.6. *Supposons que d divise $\frac{n}{k}$ et que pour toute place $v \in V$ ρ_v est une r.c.i.. Alors il existe $\pi' \in X_\pi$ telle que*

- pour toute place $v \in V \setminus \{v_1, v_2\}$ on ait

$$\pi'_v = Lg(\nu^{-\frac{k-1}{2}} C(\rho_v) \otimes \nu^{-\frac{k-3}{2}} C(\rho_v)) \dots \otimes \nu^{\frac{k-1}{2}} C(\rho_v))$$

où ν est la norme réduite et

- π'_v correspond faiblement à π_v pour $v \in \{v_1, v_2\}$.

Démonstration. La preuve est la même que pour les propositions précédentes. Seulement, quand on transfère $\pi_v = Lg(\nu^{-\frac{k-1}{2}} \rho_v \otimes \nu^{-\frac{k-3}{2}} \rho_v \dots \otimes \nu^{\frac{k-1}{2}} \rho_v)$ on trouve un élément de $Grot(G'_v)$ dont l'auteur ne sait s'il est une représentation irréductible ou pas (cas particulier qui semble assez difficile de la conjecture posée). Si on écrit cet élément comme combinaison linéaire de représentations irréductibles non-équivalentes, alors nous avons prouvé, prop. 3.11, que $Lg(\nu^{-\frac{k-1}{2}} C(\rho_v) \otimes \nu^{-\frac{k-3}{2}} C(\rho_v)) \dots \otimes \nu^{\frac{k-1}{2}} C(\rho_v))$ apparaît dans cette somme avec un coefficient non nul. Ceci suffit pour obtenir le résultat. $\square$

Remarque. S'il s'avère que la somme contient plus d'une représentation irréductible i.e. $Lg(\nu^{-\frac{k-1}{2}} \rho_v \otimes \nu^{-\frac{k-3}{2}} \rho_v \dots \otimes \nu^{\frac{k-1}{2}} \rho_v)$ ne correspond pas à $Lg(\nu^{-\frac{k-1}{2}} C(\rho_v) \otimes \nu^{-\frac{k-3}{2}} C(\rho_v)) \dots \otimes \nu^{\frac{k-1}{2}} C(\rho_v))$, alors la conjecture de multiplicité un est infirmée pour les séries discrètes de G' . Ce problème semble être assez important. Nous espérons qu'une correspondance de Jacquet-Langlands globale nous aide à démontrer un théorème de multiplicité un pour G' et à classifier le spectre résiduel de G' . Or, même si on applique la formule des traces dans sa forme générale et on sait montrer l'égalité des côtés géométriques comme dans [AC], on se heurtera dans notre cas exactement à ce problème (quel élément de $Grot(G'_v)$ correspond à une représentation irréductible donnée de G_v ?) pour conclure sur la multiplicité ou sur la classification. Déjà sur le cas particulier dans [Vi] on voit qu'une correspondance de Jacquet-Langlands globale n'est pas induite par les correspondances de Jacquet-Langlands locales, car aux places où G' est ramifié les r.c.i. de G'_v correspondent tantôt à des r.c.i. de G_v , tantôt à des d.r.c.i..

Donnons un cas particulier, valable en toute caractéristique, utile peut-être à ceux qui ont de la marge dans le choix la forme intérieure ou la représentation π .

Proposition 4.7. *Soit π une série discrète de G telle que, pour toute place $v \in V$, π_v n'est pas G'_v -nulle. S'il existe deux places v_1 et v_2 de F telles que l'une des deux conditions suivantes soit vérifiée :*

(i) π_{v_1} est cuspidale et G'_{v_2} est le groupe des éléments inversibles d'une algèbre à division,
(ii) π_{v_1} et π_{v_2} sont cuspidales,
alors il existe une unique série discrète π' de G' telle que π_v et π'_v se correspondent pour toute place v . Ceci est vrai même si la caractéristique du corps global F est non nulle.

Démonstration. Comme π_{v_1} est cuspidale, π est cuspidale. On reprend la démonstration de la prop. 4.4, en appliquant cette fois la formule des traces simple de Kazhdan-Deligne, valable en toute caractéristique, avec un coefficient non nul f_{v_1} de π_{v_1} à la place v_1 et une fonction f_{v_2} à support dans l'ensemble des éléments elliptiques réguliers à la place v_2 . D'une part, f_{v_1} n'annule pas la trace de π_{v_1} . D'autre part, grâce à l'hypothèse sur la place v_2 , il existe un f_{v_2} à support dans l'ensemble des éléments elliptiques réguliers de G'_{v_2} qui n'annule pas la trace de π_{v_2} . On obtient, comme dans la prop. 4.4, un π' tel que π'_v correspond à π_v pour tout $v \notin \{v_1, v_2\}$ et π'_{v_2} correspond faiblement à π_{v_2} . Toutefois, à cet instant, nous n'avons pas prouvé que π'_{v_1} correspond faiblement à π_{v_1} , car la fonction à la place v_1 a été fixée dès le début. Mais on sait quand même que la trace de π'_{v_1} ne s'annule pas sur une fonction qui correspond à f_{v_1} (+). Soit σ'_{v_1} la r.e.c.i. de G'_{v_1} qui correspond à π_{v_1} par Jacquet-Langlands. Alors

(++) f_{v_1} correspond à un coefficient f'_{v_1} de σ'_{v_1} et

(+++) comme π_{v_1} est cuspidale, σ'_{v_1} est cuspidale (th. 3.2, b)).

De (+), (++) et (+++) on obtient que π'_{v_1} est équivalent à σ'_{v_1} . Par conséquent, π'_{v_1} est équivalent à σ'_{v_1} . Donc, π_{v_1} correspond à π'_{v_1} .

Regardons maintenant la place v_2 où on sait que π_{v_2} et π'_{v_2} se correspondent faiblement. Dans l'hypothèse (i), comme π_{v_2} est à la fois elliptique et générique, c'est une r.e.c.i., et comme G'_{v_2} est le groupe des éléments inversibles d'une algèbre à division, il est clair que π_{v_2} et π'_{v_2} doivent se correspondre par Jacquet-Langlands. Dans l'hypothèse (ii), on utilise le lemme 4.2 :

(a) π'_{v_2} étant elliptique, elle correspond faiblement à une r.e.c.i. σ'_{v_2} de G'_{v_2} ,

(b) π'_{v_2} et σ'_{v_2} ont le même support cuspidal (voir preuve du lemme 4.2).

Soit τ'_{v_2} l'image de π_{v_2} par la correspondance de Jacquet-Langlands ; alors

(c) τ'_{v_2} est alors cuspidale (th. 3.2, b)).

Maintenant σ'_{v_2} et τ'_{v_2} se correspondent faiblement puisque π'_{v_2} et π_{v_2} se correspondent faiblement. Comme σ'_{v_2} et τ'_{v_2} sont des r.e.c.i., elles sont équivalentes (orthogonalité des caractères sur G'_{v_2}). Par le (b) et (c), π'_{v_2} est équivalente à τ'_{v_2} . $\square$

Le résultat du corollaire suivant est déjà connu de tous. Le corps global F est de caractéristique quelconque.

Corollaire 4.8. Soit S un ensemble fini de places finies de F . Pour tout $v \in S$ on se donne une représentation de carré intégrable τ'_v de G'_v . Alors il existe une représentation automorphe cuspidale π' de G' telle que, pour tout $v \in S$, π'_v est équivalente à τ'_v .

Démonstration. Quand G' est GL_n , ce résultat est, par exemple, le lemme 6.5 de [AC]. Si G' est une forme intérieure de GL_n , posons, pour tout $v \in S$, $\tau_v = Ca^{-1}(\tau'_v)$. On considère l'ensemble $\{\tau_v\}_{v \in S} \cup \{\tau_{v_1}, \tau_{v_2}\}$ où v_1 et v_2 sont deux places qui ne se trouvent

pas dans S , et τ_{v_1} et τ_{v_2} sont des représentations cuspidales unitaires de G_{v_1} resp. G_{v_2} . En appliquant le résultat à $G = GL_n$, on trouve qu'il existe une représentation cuspidale π de G telle que π_v est équivalente à τ_v pour tout $v \in S \cup \{v_1, v_2\}$. Si on applique la proposition précédente, cas (ii), à π , on trouve une représentation cuspidale de G' qui a les propriétés voulues. $\square$

4.3. Conséquences sur l'unitarisabilité. Nous donnons ici deux corollaires. Les résultats dus à Tadič ou conjecturés par Tadič qui apparaissent dans cette section se trouvent dans [Ta]. Le corps de base est ici de caractéristique nulle.

Corollaire 4.9. *Tout élément de $Du(G'_v)$ est unitarisable.*

Démonstration. On peut obtenir tout élément de $Du(G_v)$ comme composante locale d'une représentation π comme dans la prop. 4.5, parce qu'on peut toujours trouver une représentation cuspidale ρ de $GL_{\frac{n}{k}}$ qui ait des composantes locales cuspidales unitaires données aux places dans V . $\square$

Remarque. Ce corollaire est un cas particulier de la conjecture $U1$ à la fin de [Ta] (ce que Tadič y conjecture pour les r.c.i. nous l'avons montré ici pour les cuspidales unitaires).

Corollaire 4.10. *Si $G'_v = GL_r(A_v)$ (A_v algèbre à division) et l'entier k divise r , si δ est une r.c.i. de $GL_{\frac{r}{k}}(A_v)$, alors*

$$Lg(\nu^{-\frac{k-1}{2}}\delta \otimes \nu^{-\frac{k-3}{2}}\delta \dots \otimes \nu^{\frac{k-1}{2}}\delta)$$

est unitarisable.

Démonstration. On peut toujours trouver une représentation cuspidale ρ de $GL_{\frac{n}{k}}$ qui ait des composantes locales r.c.i. données aux places dans V . La présente proposition est une conséquence facile de ce fait, comme dans le corollaire précédent, mais en utilisant cette fois la prop 4.6. $\square$

Remarque. C'est aussi un cas particulier des conjectures de Tadič dans [Ta]. Prenons un exemple simple :

$$Lg(\nu^{-2}\delta \otimes \nu^{-1}\delta \dots \otimes \nu^2\delta).$$

Supposons que $\nu_\delta = \nu^3$.

Alors [Ta], prop. 4.3 implique que $\nu^{-\frac{3}{2}}\delta \otimes \nu^{\frac{3}{2}}\delta$ est réductible et la conjecture $U1$ de Tadič implique que $Lg(\nu^{-\frac{3}{2}}\delta \otimes \nu^{\frac{3}{2}}\delta)$ est unitarisable.

La prop. 2.2 combinée au lemme 2.5 (toutes les deux dans [Ta]) impliquent alors que l'induite τ de $\nu^{-\frac{1}{2}}Lg(\nu^{-\frac{3}{2}}\delta \otimes \nu^{\frac{3}{2}}\delta) \otimes \nu^{\frac{1}{2}}Lg(\nu^{-\frac{3}{2}}\delta \otimes \nu^{\frac{3}{2}}\delta)$ est irréductible. Elle est unitarisable par la conjecture $U2$ de Tadič.

Comme δ est unitaire aussi, la première conjecture $U0$ de Tadič implique que l'induite de $\tau \otimes \delta$ est irréductible unitaire.

La prop 2.3 dans [Ta] implique que l'induite de $\tau \otimes \delta$ n'est autre que $Lg(\nu^{-2}\delta \otimes \nu^{-1}\delta \dots \otimes \nu^2\delta)$.

5. BIBLIOGRAPHIE

- [AC] J.Arthur, L.Clozel, *Simple Algebras, Base Change, and the Advanced Theory of the Trace Formula*, Ann. of Math. Studies, Princeton Univ. Press 120, (1989).
- [Ar] J.Arthur, The invariant trace formula II. Global theory, J. of the A.M.S. (1988), vol 1, no.3, 501-554.
- [Au] A.-M. Aubert, Dualité dans le groupe de Grothendieck de la catégorie des représentations lisses de longueur finie d'un groupe réductif p -adique, *Transactions A.M.S.*, Vol.347, No.6, 1995.
- [Ba1] A.I.Badulescu, Orthogonalité des caractères pour GL_n sur un corps local de caractéristique non nulle, *Manuscripta Math.* 101 (2000), 49-70.
- [Ba2] A.I.Badulescu, Correspondance de Jacquet-Langlands en caractéristique non nulle, prépublication Univ. Poitiers no. 155, juin 2001, à paraître dans *Ann. Sci. de l'Éc. Norm. Sup.*
- [Ba3] A.I.Badulescu, Un résultat de finitude dans le spectre automorphe pour les formes intérieures de GL_n sur un corps global, *Prépublication*.
- [BDK] J.Bernstein, P.Deligne, D.Kazhdan, Trace Paley-Wiener Theorem for reductive p -adic groups, *J. Analyse Math.* 47 (1986), 180-192.
- [Bo] Bourbaki, *Théories spectrales, Chap.1-2*, Hermann, Paris.
- [Ca] W.Casselman, Introduction to the theory of admissible representations of reductive p -adic groups, preprint.
- [Cl1] L.Clozel, Théorème d'Atiyah-Bott pour les variétés p -adiques et caractères des groupes réductifs, *Mémoires de la S.M.F.* no. 15, Nouvelle série, 1984, 39-64.
- [Cl2] L.Clozel, Invariant harmonic analysis on the Schwarz space of a reductive p -adic group, *Proc.Bowdoin Conf.1989, Progress in Math.Vol.101*, Birkhäuser, Boston, 1991, 101-102.
- [DKV] P.Deligne, D.Kazhdan, M.-F.Vignéras, Représentations des algèbres centrales simples p -adiques, *Représentations des groupes réductifs sur un corps local*, Hermann, Paris 1984.
- [vD] G. van Dijk, Computation of Certain Induced Characters of p -adic Groups, *Math. Ann.* 199, 1972, 229-240.
- [FK] Y.Flicker, D.Kazhdan, Metaplectic correspondence, *Publ. Math. IHES* 64 (1987), 53-110.
- [H-CvD] Harish-Chandra, G. van Dijk, *Harmonic Analysis on Reductive p -adic Groups*, *L.N.M.*, Springer-Verlag, 1970.
- [JL] H.Jacquet, R.P.Langlands, *Automorphic forms on $GL(2)$* , Lecture Notes 114, Springer 1970.
- [Le] B.Lemaire, Intégrales orbitales sur $GL(N)$ et corps locaux proches, *Ann.Inst. Fourier* 46 (1996), 1027-1056.
- [MW] C. Moeglin, J.-L. Waldspurger, Le spectre résiduel de GL_n , *Ann. Sci. École Norm. Sup.* t.22 (1989), 605-674.
- [Sh] J.A.Shalika, The multiplicity one theorem for GL_n , *Ann. of Math.* 100 (1974), 171-193.
- [Ta] M.Tadič, Induced representations of $GL(n; A)$ for a p -adic division algebra A , *J. Reine angew. Math.* 405 (1990), 48-77.

- [Vi] M.-F. Vignéras, Correspondence between GL_n and a division algebra, prépublication.
- [Ze] A. Zelevinski, Induced representations of reductive p -adic groups II, *Ann. Sci. ENS* 13 (1980), 165-210.